

新編醫學正傳

醫學正傳卷之四目錄

○眩暈門二十八論

脉法

丹溪方法凡三條

防風通聖散

半夏白朮天麻湯

加味六君子湯

六合湯

濟生玉液湯

芎朮湯

川芎散

丹溪活套

○頭痛門二十九論

脉法

丹溪方法凡七條

選奇湯

肩骨痛方

清空膏

半夏白朮天麻湯安神湯

徹清膏

川芎散

白芷散

羌活清空膏

清上瀉火湯

細辛散

羌活湯

一粒金

羌活附子湯

麻黃附子細辛湯

吳茱萸湯

加味調中益氣湯

玉壺丸

川芎茶調散

元戎三陽頭痛方

如聖餅子

川芎神功散

三因芎辛散

小芎辛湯

寶鑑石膏散

三生丸

茯苓半夏丸

祖傳經驗方

又經驗敷貼方

丹溪活套

○胃脘痛門三十論

脉法

丹溪方法九十二條

黃連六一湯

連附六一湯

草薺薏丸

麻黃薺薏丸

木香化滯湯

三因倉卒散

河間金鈴子散

神聖代鉞散

木附湯

丹溪活套

祖傳加味枳朮丸

已試醫驗一條

○腹痛門三十一論

脉法

丹溪方法九十五條

高良姜湯

草薺薏湯

益胃散

厚朴溫中湯

六合散

沒藥散

東垣木香枳榔丸 枳實導滯丸

瓜蒂散

桂枝加芍藥湯 小建中湯

真武湯

霹靂散 酒煮當歸丸

黃連湯

芍藥甘草湯 加減小柴胡湯

四物苦練湯

損填當歸丸 苦練丸

一捏金散

丹溪活套 已試醫驗二條

○腰痛門三十二論 脉法 丹溪方法九七條

腎着湯 青娥丸

立安丸

補骨脂丸 東垣獨活湯

摩腰丹

煨腎丸 補腎丸

蒼朮湯

川羌肉桂湯 地龍散

粘痛湯

蒼朮煨熟散 一粒金丹

加味四物湯

三因安腎丸

獨活寄生湯

五積散

卅溪活套

○脇痛門三十三論

脉法

卅溪方法一條

當歸龍薈丸

木氣實脇痛方

左金丸

破血行氣方

加味二陳湯

肝苦急方

左脇痛方

控涎丹

咳嗽脇痛方法

氣弱人脇痛方

去滯氣痛方

肥白人脇痛方

瘦黑人脇痛方

又卅溪方法凡五條推氣散

枳芎散

異香散

分氣紫蘇飲

芎藭湯

卅溪活套

已試醫驗一條

○諸氣門三十四論

脉法

卅溪方法凡六條

清膈丸

正氣天香湯

子和木香枳榔丸

蘇合香丸

蘇子降氣湯

異香散

沉香降氣湯

復元通氣散

木香流氣飲

丹溪活套

○疝氣門 三十五論

脉法

丹溪方法 九十三條

三因葱白散

又丹溪方法 九四條

疝氣神方

又治疝方

五葉湯

肥人腫疝方

吳茱萸湯

茴香練實丸

蒺藜湯

木香散

香殼散

沉香桂附丸

加味五苓散

又茴香練實丸

天台烏藥散

濟生葵子湯

丁香煉實丸

一捏金散

丹溪活套

祖傳馬蘭花丸

○脚氣門 三十六論

脉法

丹溪方法 一條

治濕熱脚氣方

防已飲

健步丸

加味四物湯

治食積流注方

轉筋屬血熱方

羌活導滯湯

當歸粘痛湯

開結導引丸

麻黃左經湯

半夏左經湯

六物附子湯

換腿丸

五積散

導水丸

除濕丹

三花神祐丸

祖傳杉木節飲

又經驗勝濕餅子

○痛風門三十七論

脉法

丹溪方法九十一條

加味四物湯

又丹溪方法六十二條

治上中下痛方

大羌活湯

四妙散

飲酒濕痰痛風方

肢節腫痛方

二妙散

潛行散

手臂痛方

加味二陳湯

治痛風神效方

婦人背血走痛走注疼痛方

定痛丸

世用草藥獲効辨黃芪酒

獨滑寄生湯

防風天麻散

舒筋湯

祖傳九藤酒

經驗加味二妙丸經驗川木通湯

經驗薰洗痛風法

○痿証門三十八論

脉法

丹溪方法九九條

溫痰加味二陳湯血虛加味四物湯

氣虛加味四物湯

又丹溪方法二條治痿加味四物湯

東垣健步丸

大防風湯

祖傳經驗方

經驗鹿角膠丸

○諸虫門三十九論

脉法

丹溪方法九二條

治惡桃仁湯

雄黃銳散

寶鑑化虫丸

集効丸

萬應丸

白臘墜丸

黑鉛栴榔散

化虫丸

苦練湯

前胡湯

茱萸根湯

五膈下氣丸

千金散

三聖飲子

五鳳丸

雷公丸

廣濟療蛔虫方

又治蛔虫方

祖傳換柳丸

經驗陰蝕瘡方

附發砂論

新編醫學正傳卷之四

花溪恒德老人虞搏天民編集

姪孫虞牛愚惟明校正

眩運二十八

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木又曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減甚則怱怱善怒眩冒顛疾雖為氣化之所使然未必不由氣體之虛衰耳其為氣虛肥白之人濕痰滯於上陰火起於下是以痰挾虛火上衝頭目正氣不能勝敵故忽然眼黑生花若坐舟車而旋運也甚而至於卒倒無所知者有之卅溪所謂無痰不能作眩者政謂此也若天黑瘦之人軀體薄弱真水虧欠或勞役過度相火上炎亦有時

特眩運何濕痰之有哉大抵人肥白而作眩者治宜清痰降火為先而兼補氣之藥人黑瘦而作眩者治宜滋陰降火為要而帶抑肝之劑抑攷內經有曰風勝則地動風木太過之歲亦有因其氣化而為外感風邪而眩者治法宜祛風順氣伐肝降火為良策焉外有因嘔血而眩胃者膏中有死血迷閉心竅而然是宜行血清心自安醫者宜各類推而治之無有不痊者也

脉法

左手脉數熱多

脉澁而芤有死血

右手脉實有痰積

脉虛大必是久病

左手人迎脉緩而浮大者屬風

方法

冊溪方法
三條

丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此証屬痰者多

蓋無痰不能作眩也雖有因風者亦必有痰又曰火動其

痰二陳湯加黃芩蒼朮羌活挾氣虛者亦以治痰為主兼

補氣降火藥

○去血過多而眩運者芍歸湯

○眩運不可當者以大黃酒炒為末茶清調下急則治其標也

○防風通聖散治風熱眩運方見中風門

○半夏白朮天麻湯治風痰眩運方見頭痛門

○加味六君子湯治氣虛痰盛兼挾風邪眩運不休者

陳皮去白

半夏湯泡透

茯苓一錢 甘草半錢炙

荆芥穗半錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞煎至一盞

去祖入竹瀝一大匙溫服

○六合湯治風虛眩運

四物湯加秦芫羌活為佐水煎服之

○玉液湯治七情感動氣鬱生涎隨氣上衝頭目眩運心嘈忪

悸肩稜骨痛

大半夏

湯泡七次去皮實

右以一味薄切成片每服四錢加生姜十片煎入沉香磨

水一呷服大効

○芍木湯治胃雨中濕眩運嘔逆頭痛不食等証

川芎

半夏通透白朮二分

甘草六分

右細切作一服加生姜七片水一盞半煎至一盞溫服

○川芎散治風眩運

山茱萸

去核

山藥

甘菊花

人參

茯神

小芍藥

去半

右為細末每服二錢溫酒調下

時溪活套云眩暈者中風之漸也如肥白人氣虛而挾痰者四君子湯倍蜜炙黃芪加半夏橘紅或少加川芎荊芥穗以清利頭目也如痰盛而挾氣虛者二陳湯加入參白朮黃芪或少加炮附子煎入竹瀝姜汁服如體瘦血虛而痰火煎盛者二陳湯合四物加片苓薄芩煎入竹瀝姜汁童便服如諸般眩暈挾風則加防風荆芥天麻秦艽等藥挾熱加片苓黃連枳實之類挾寒加乾姜官桂附子之屬無有不安者也

頭痛廿九

論

內經曰心沐中風則為首風又曰首風之狀頭面多汗惡風
當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風曰則病少愈
東垣曰金匱真言論曰東風生於春病在肝論在頸項故春
氣者病在頭又諸陽會於頭面夫風從上受之風寒傷上邪
從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府
調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭
痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛
者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下
頭痛顙疾者下虛工實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕
頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明

明

日

升

此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節者死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛也凡頭痛皆以風藥治之者總其大体而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者亦麻葛根石膏芷為主太陰頭痛必有痰體重虛或腹痛為痰癰其脉沉緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃細辛附子為主厥陰頭痛或吐痰末厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛川歸川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其効

如神白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也清室膏乃風濕熱
頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以
若藥吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時面頰青黃革
眩目不欲開懶言身體沉重元元欲吐潔古曰此厥陰太陰
合病名曰風痰頭痛以局方玉壺丸治之更灸俠溪穴即愈
是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失
可謂上工矣學者其可執一而不知變乎

脉法

內經曰寸口脉中短者頭痛也

脉經曰陽弦則頭痛又曰寸口脉浮中風發熱頭痛

脉緊頭痛是傷寒脉緊上寸口者傷風頭痛

脉決云頭痛短濇應瀕死浮滑風痰皆易除

方法

丹溪方法
九七條

丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火

○勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽穴痛甚此相火自

下衝上宜補中益氣湯加川芎當歸甚者加知母蔓荊子

細辛

○諸經氣滯亦作頭痛宜分經理氣處治

○偏頭風在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熱用酒制片黃芩在

左屬風及血虛風用荊芥薄荷

或云荊芥薄荷是頭痛要藥宜詳証加用血虛

用芎歸芍藥酒黃芩諸家不分所屬故藥多不効少陽偏

頭痛者多便秘或可下之

○一方治風濕熱頭痛神効

片苓

一兩酒

蒼朮

羌活

防風

各五錢

蒼耳子 三錢 細辛 二錢

右為細末以生姜一片搗細和藥末三錢搗勻茶清調下

一方有生甘草酒連川芎炒半夏更無妨風細辛

○一方治少年強壯人氣實有痰或頭暈而重痛立効

大黃 酒拌炒乾再拌三次

右為細末湯清調下

○一方治肩稜骨痛屬風熱與痰

白芷 片苓 酒制炒

各等分為細末每服二錢茶清調下

○選奇湯治肩骨痛不可忍神効

羌活 防風 各二錢 甘草 一錢 夏生冬炒

酒片苓 一錢半冬不用甚者冬亦炒用

方局

右細切作一服水二盞半煎至一盞食後服

○又方因風寒肩骨痛不止者

川烏

草烏

用各一錢已上二味俱細辛酒浸二宿炒用

羌活

片苓

酒拌炒甘草炙各半分

右為細末分二服茶清調下

東垣

○清聖膏治偏正頭痛年深久不愈者善療風濕熱頭痛上壅

頭目及腦痛不止者除血虛頭痛不治

川芎

五錢

柴胡

七錢

黃連

酒炒

防風

去芦

羌活

各一兩

甘草

炙一兩

片黃芩

三兩

切片酒拌

乾

右為細末每服二錢熱盞內入茶清少許湯調如膏貼外

抹口內少用白湯送下如若頭痛每服加細辛二分如太

陰脉緩有痰名痰厥頭痛咸羌活防風川芎甘草加半夏

麴一兩伍錢如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一
半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴自陽明頭痛只服白虎
湯加吳白芷立愈

○半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩悶氣促上
喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭若痛如
裂身重如山四肢厥冷不得安卧

黃柏一分半

乾姜二分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮各三分半

神麴炒

白朮各五分
麥蘖麴

半夏湯去皮脐

橘紅各七分半

右細切作一服水二盞加生姜三片煎至一盞去粗稍熱
服食前可一服而愈此頭痛若甚謂之足太陰痰厥頭痛

非半夏不能除眼黑頭旋風虛內作非天麻不能療黃芪
并溫瀉火補氣實表止汗人參并溫瀉火補中益氣二木
俱若并溫除濕補中澤瀉茯苓利小便導濕橘皮若溫益
氣調中神麴消食蕩胃中滯氣大麥蘖寬中助脾乾姜辛
熱以滌中寒黃栢若辛以療冬天小火在泉發躁也

東垣

○安神湯治頭痛頭旋眼黑

生甘草 炙甘草 各二分 防風 二分半 柴胡

升麻 生地黄 酒浸洗 知母 酒浸炒 黃栢 酒拌炒

羌活 各一錢 黃芪 一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞半加蔓荊子五分川芎
三分再煎至一盞去粗臨卧稍熱服

東垣

○散青膏

垣東

蔓荊子

細辛各一錢

薄荷葉

川芎各三錢

生甘草

炙甘草各五錢
藥本一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

○川芎散治頭目不清利

川芎五錢

柴胡二錢

羌活

防風

藥本

生甘草

升麻各一兩
炙甘草

生地黃

各一兩

酒黃連炒

酒片苓各二兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

○白芷散一名紫金散治諸熱若頭痛

鬱金一錢

白芷

石膏各二錢
雄黃

芒硝

薄荷葉各三錢

右為細末口含水鼻內搐之

垣東

恒東

○羌活清空膏

蔓荊子一錢 黃連三錢 羌活 防風 甘草各四錢

片苓一兩

右為細末每服一錢茶清調下食後或臨卧服

恒東

○清上瀉火湯昔有人年少時氣弱常於煮海三里穴節次灸之至年老成熟厥頭痛雖冬天大寒喜寒風風吹之頭痛即愈暑來煖處或見煙火其痛復作此灸之過也

荊芥穗 川芎各二分 蔓荊子 當歸身

蒼朮各三分 酒黃連 生地黃 桑本各四分

生甘草二分 升麻 防風各三分 半酒黃柏

炙甘草 黃芪各五分 酒黃芩 酒知母各七分

羌活八分 柴胡一錢 細辛三分 酒紅花少許

東垣

○細辛散治偏正頭痛
右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍熱服

細辛

瓦粉

各二分

生黃芩

芍藥

各三分半

酒黃連

川芎

各半錢

炒黃芩

酒洗

甘草

炙各八分

柴胡

去芦一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞食後服

東垣

○羌活湯治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草

半一分

澤瀉

三分

酒枯姜根

白茯苓

酒黃柏

各四分

柴胡

五分

防風

酒黃芩

酒黃連

羌活

各六分

右細切作一服水二盞煎至一盞食後或臨卧服

東垣

○一粒金

卷之四

三

華撥

以猪胆汁拌勻入

玄胡索

清代

白芷

川芎 各一兩

右為細末無根水為丸每用一九以無根水化開搗鼻內
外以銅錢咬口內出涎

○羌活附子湯治冬寒犯腦痛及齒亦痛名曰腦風

麻黃

不去節

附子炮

防風

白芷

殭蚕

黃栢

各七分

羌活

蒼朮

各半錢

升麻二分

黃芪

三分

甘草二分

佛耳草

三分無散不用

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○麻黃附子細辛湯治三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒

厥頭痛其脉沉細

麻黃

細辛

各六錢

附子

一箇去皮

右細切水三升三合先煮麻黃令沸減七合掠去上沫納諸藥煎取一升去粗分三服

○吳茱萸湯治厥陰頭項強痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩

吳茱萸

生姜

各半兩人參二錢半

右細切作一服水二盞大棗一枚煎至一盞去粗溫服

○加味調中益氣湯治氣血俱虛頭痛其効如神

陳皮

黃柏

酒炒各升麻

柴胡

去芦各四分

人參

炙甘草

蒼朮

各六分

黃芪

一錢

川芎

六分

蔓荊子

三分

細辛

二分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服一方有木香

二分無黃柏如大便虛坐不得或了而不了服中逼迫此

血虛血澁也加當歸身五分

愚按東垣謂此方治氣血

方局

俱虛頭痛本方加當歸一味雖無已上証亦恐不可失也
○玉壺丸治風濕頭痛亦治痰患

雄黃一錢

南星煨梨

半夏

湯炮七次去皮

天麻

白木

各二錢

右為細末姜汁浸蒸餅為丸服

方局

川芎茶調散治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲重

薄荷

四兩

荊芥穗

川芎

各二兩

羌活

白芷

甘草

各一兩

細辛

半兩

防風

二錢半

右為細末每服二錢食後茶清調下

無太雅

○醫壘元戎治三陽頭痛方

羌活

防風

荊芥穗

升麻

葛根

白芷

石膏

柴胡

川芎

芍藥

細辛

葱白

連須者

各等分細切五錢水二盞煎至一盞溫服

○如聖餅子治風寒伏留陽經痰飲氣厥頭痛

防風

天麻各半兩南星

乾姜

川芎

甘草各一兩半夏半兩

川烏去火一兩

右為細末熬餅糊調捻作餅子如錢樣每用五餅同荊芥末細嚼茶清送下

○川芎神功散治風熱上攻頭目令人偏正頭痛

川芎

川烏

白芷

南星

麻黃各一錢甘草半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗食後溫服

○三因芎半散治傷風寒生冷及氣虛痰厥頭痛如破煎眩暈

嘔吐

附子

去皮臍生用

烏頭

去皮生用

南星

乾姜

甘草

炙

川芎

細辛

各一錢

右細切作一服加生姜五片茶芽小許水二盞煎至一盞去粗溫服

○小芎辛湯治風寒在腦或感邪溫頭重而疼眩運嘔吐

川芎

二錢

細辛

白朮

各一錢

甘草

半錢

右細切作一服加生姜五片茶芽少許水煎服

○寶鑑右膏散治陽明經頭痛大効

川芎

石膏

白芷

各等分

右為細末每服四錢茶清調下

○三生丸治痰厥頭痛

半夏

白附子

南星 各等分

右為細末生薑自然汁浸蒸餅為丸如棗葢大每服四五
十丸食後姜湯送下

○茯苓半夏湯治風熱痰逆嘔吐頭痛

半夏 二錢

赤茯苓 一錢

片黃芩

甘草

橘紅 各半錢

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服

○祖傳經驗治頭風熱痛不可忍者

片黃芩

二兩酒拌濕炒再拌再炒三次不可冷焦 小川芎 一兩

白芷

半兩

細茶芽 三錢

荊芥穗 四錢

薄荷葉 二錢

右為細末每服二錢白湯或茶清調下

○又經驗敷貼頭風熱痛

朴硝

大黃 各等分

右為細末用深井底泥和捏作餅子貼兩大陽穴神驗

○丹溪活套云凡治頭風必以二陳湯加川芎白芷為主○如
太陽經頭痛加羌活○陽明經加石膏白芷○少陽經加
柴胡黃芩○太陰經加蒼朮○少陰經加細辛○厥陰經
加吳茱萸○如肥人頭痛必是濕痰加半夏蒼朮○如
瘦人頭痛是熱上壅多加酒洗片黃芩○如因感冒而頭
痛者宜加防風羌活藁本升麻柴胡葛根之類○如氣虛
而頭痛者宜一黃芪人參東垣安神湯之類○如風熱在
上而頭痛者加天麻蔓荊子台芎酒片苓之類○如若頭
痛者宜用細辛○如形瘦色弊而頭痛者是血虛宜用歸
身芍藥酒黃柏之類○如頂巔痛者宜藁本酒炒升麻

麻

胃脘痛 論 三十

論

內經曰木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脇痛膈噎不通
食飲不下蓋木氣被鬱發則太過故民病有土敗木賊之
候也夫胃為脾之府陽先於陰故歲未病而府先病也甚而
至於脇下如刀剗之痛者已連及於歲矣古方名為脾疼者
是也胃之上口名曰賁門賁門與心相連故經所謂胃脘當
心而痛今俗呼為心痛者未達此義耳雖曰運氣之勝復未
有不由清痰食積鬱于中七情九氣觸于內之所致焉是以
清陽不升濁陰不降而肝木之邪得以乘機侵侮而為病矣
更原厥初致病之由多因縱恣口腹嗜好辛酸恣飲熱酒煎
炒復食寒涼生冷朝傷暮損日積月深自鬱成積自積成痰

痰火煎熬血亦妄行痰血相雜妨碍升降故胃脘疼痛吞酸
噯氣噯雜惡心皆膈噎反胃之漸者也俗醫不究其源例以
辛香燥熱之劑治之以火濟火遂成危劇良可痛哉古方九
種心痛曰欬曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰虫曰疰曰去來痛
夫所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥治之手詳其所由皆在
胃脘而實不在於心也有真心痛者大寒觸犯心君又曰汚
血衝心手足青過節者且發夕死夕發旦死醫者宜區別諸
証而治之無有不安之理也

脉法

脉經曰陽微陰弦則胃痺而痛責其虛也

今陽虛知在上焦所以胃痺心痛者以其脉陰弦故也

胃痺之病端息欬噯胃痺痛短氣寸口脉沉而遲關上小緊

而數

心脉微急為痛微大為心痺引背痛

脉短而數者心痛 瀉者心痛 脉浮大弦長者死

方法

丹溪方法九
二十二條

丹溪曰心痛卽胃脘痛須分久新若明知身犯寒氣口得寒物而病於初得之時當用溫散溫利之藥若病久則成鬱矣鬱則成熱原病式中倚言之矣若欲行溫散溫利寧參助火添病耶由是古方多用山梔子為君熱藥為之嚮導則邪易伏病易退病安之後若縱恣不改前非病必再作難治矣此病雖日久不食不死又曰中宮有食積與痰而生病者胃氣亦賴所養卒不便虛雖日數多不食不死若痛方止卽吃物病必復作勿歸咎於醫也必須再服三五

服藥後以漸而少食方可獲全安

○心膈大痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不効者就吐中以鵝翎探之出痰積碗許而痛卽止

○脉堅實不大便者下之亦可

○一方用黃荊子炒焦為末米飲調服一云上可治心痛下可治白帶

○又方用藍葉搗細取汁合姜汁服

○又方用青黛以姜汁入湯調服

○又方用海粉佐以香附末以川芎山梔子煎湯入姜汁調服

○又方無藥處以鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰愈

此法治絞腸沙大痛幾死者立効

○又方治心痛輕者以麻黃桂枝之類散之或以韭汁開提之

重者加石鱗

輕

○又方痛甚者脉必伏宜溫藥附子之類不可用人參白朮蓋諸痛不可補氣故也

○又方治氣痛者用牡蛎粉一二錢酒溫調下

○又方治濕痰作痛用白螺螄殼去泥沙火煨為細末每服方寸七溫酒調下立止

○又方以物桂按而痛定者屬虛以二陳湯加炒乾姜末和之而愈

○又方山梔大者七枚或九枚炒焦黃用水一盞煎七分入生薑自然汁二三匙全辣熱飲之立止 玄

○又方山梔子刳止之後復發者前藥必不効用去明粉一錢匕白湯送下立止

食

○又方治平日喜好熱物致死血流於胃口而作痛者以挑仁

承氣湯下之安

○又方治死血作痛証用玄胡索一两半桂心紅花滑石紅麴各五錢桃仁三十箇蒸餅丸服効

○又方治虫痛者必面有白斑唇紅能食時作時止用二陳湯加若練根煎服

○又方治痰積胃脘作痛白螺殼丸

白螺殼火炒

義茶木

山梔子

香附童便浸

南星

煨裂各一兩

枳殼

麩炒黃色

青皮

木香

半夏

砂仁

各五錢

右為末春加川芎夏加黃連秋冬加吳茱萸用生姜汁浸蒸餅為丸如棗葦大每服五十丸

姜湯下異本

○黃連六一湯治多食煎炒或燒餅米胖等物致熱鬱胃口而

痛者甚効方見恒吐門

○連附六一湯治胃脘痛甚諸藥不効者天因熱用方也寒

黃連六錢 附子炮去火一錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗稍熱服

○草豈蔻丸治客寒犯胃作痛或因濕熱鬱結作痛亦可劫而

止之又治氣弱心痛亦妙

草豈蔻一兩 橘紅

吳茱萸湯泡 人參

白殭蚕 黃芪

益智仁各八錢 生甘草

炙甘草 當歸身

青皮各六錢 澤瀉小使多者

半夏各一兩 桃仁去皮尖 麥蘖麵一兩 神麴炒微黃

柴胡不痛 姜黃各四錢

垣東

右為細末桃仁另研如泥入諸藥中和勻再研湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸白湯送下食遠

○麻黃豈薤丸治客寒犯胃心頭大痛不可忍

木香

青皮

紅花

厚朴姜制各二錢

蘇木三分

萆澄茄四分升麻

半夏湯泡七次

麥蘖麴

砂仁

黃芪

白朮

陳皮去白

柴胡

炙甘草

吳茱萸

當歸身各五

益智仁六分

神麴炒一錢

麻黃不去節二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下或細嚼白湯送下亦可

垣東

○木香化滯湯治因憂食濕麴結於胃脘腹皮抵痛心下硬微

滿不思飲食食之不散常常痞氣不安方見痞滿門

○三因倉卒散治氣自腰腹間攻心痛不可忍腹中冰冷自汗

如洗手足率急厥冷

山梔子大者四十九枚連皮剉碎炒焦附子一枚泡去皮臍

左為末每服二錢酒一盞煎八分溫服

○金鈴子散治熱厥心痛

金鈴子 玄胡索 各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下白湯亦可

○神聖代鍼散治心腹諸痛

乳香 沒藥 當歸 白芷 川芎

各半兩 元青一兩去足炒

右為細末每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次搽藥末在茶上不得吹攪立地細細呷之心痛欲死者服之立

問河

問河

効小腸氣痛如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛婦人血癖血迷血運血刺痛衝心胎衣不下難產但是一切因血作痛之疾服之大有神効

○木附湯治寒厥暴痛脉微氣弱

附子炮五分白朮二錢甘草一錢炙

右細切作一服水一盞半入生姜五片大棗二枚煎至一盞去粗溫服此藥又治風濕相搏身重煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅實小便自利及風虛頭目眩暈不知食味煖肌補中助陽氣止有汗之聖藥也

○丹溪活套云草薢一味性溫能散滯氣利膈上痰若胃脘果因寒而作痛用之如鼓應桴若濕痰鬱結成痛者服之多効若因熱鬱而痛者理固不當用此但宜以涼藥監制

如芩連梔子之屬其功尤速東垣草薢菴丸寒熱心痛俱
獲奇功但因熱者不可多服久服恐有積溫成熱之患耳
若久病鬱熱已膠固者斷不可用此味也○胃中若有流
飲清痰作痛腹中漉漉有聲及手足寒痛或腰膝脊脇抽
掣作痛者用小胃丹或三花神祐丸或控涎丹漸漸服之
能徹去病根即止

○祖傳經驗加味枳木丸治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘
雜當心而痛及痞滿惡心嘔吞酸嘔吐脾疼等証其
効如神

白朮 三兩

枳實 數炒

蒼朮 米泔浸

猪苓 去黑皮

麥蘖麪 炒

神麪 炒

半夏 湯洗

澤瀉 去毛

赤茯苓 去皮

黃連 陳壁土

白螺蛸殼 煅

縮砂仁

草薺薹

黃芩

陳壁土同炒

青皮去白

萊菔子

炒

乾生姜

各五錢

陳皮

去白

香附米

童便浸

瓜蒌子

厚朴

姜汁制炒

檳榔

各三錢

木香

甘草各二錢

吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢熱月二錢

半○久病挾虛加人參白扁豆石蓮肉各五錢○時常口

吐清水加抄滑石一两牡蛎五錢○右為細末用青荷葉

泡湯浸晚粳米研粉作糊為丸如梧桐子大每服七十九

多至一百丸清米飲送下

一男子年三十五胃脘作痛久失人形黃瘦食少而胃中常

若食飽來求治與加味枳朮丸服不効而日漸大痛呌號

聲聞四隣別父母妻子囑付後事欲自殺予與桃仁承氣

湯作大劑與之連二服大下瘀血四五碗許困倦不能言

語者三日教以稀粥少食漸漸將理病全安復壯如舊

腹痛三十一

論

內經曰寒氣入經而稽遲泣

與逆通

而不行客於脉外則血少

客於脉中則氣不通故卒然而痛

云

按內經舉痛論言寒

邪外客而痛者甚為詳悉未能盡述學者自宜檢閱外有因

虛因實因傷寒因痰火因食積因死血者種種不同亦當表

而出之庶使學者易為參考焉東垣曰腹中諸痛皆由勞役

過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而客入之故卒然而作

大痛經云得炅則止此事難知集論曰傷寒中脘痛大陰也

理中湯黃芪建中湯之類臍腹痛者少陰也四物湯真武湯

附子湯之類小腹痛厥陰也重則正陽散回陽丹輕則當歸

四逆湯之類太陰連少陰痛甚者當變為下利不止若夫雜
病腹痛四物苦練湯酒煮當歸丸之類夏月腹痛肌熱惡熱
脉洪數屬手太陰足陽明黃芩芍藥湯主之秋月腹痛肌寒
惡寒脉沉疾屬足太陰足少陰桂枝芍藥湯主之四時腹痛
芍藥甘草湯主之原病式曰熱鬱于內則腹滿堅結而痛不
可例言為寒也成無已曰陰寒為邪者則腹滿而吐食不下
自利益甚腹疝痛太陰証也發汗不解醫反下之因而腹滿
時痛者屬太陽也桂枝加芍藥湯主之大實而痛者加桂加枝
大黃湯主之又曰邪氣聚於下焦則津液不得宜通血氣不
得流行或溺溢或血流滯於下而生脹滿硬痛也若從心下
至小腹皆鞭滿而痛者是邪實也須以大陷育湯下之若但
小腹鞭滿而痛小便利者則是蓄血之証小便不利者則為

枝
1

溺溢之証也其有血虛瘦弱之人津液枯涸傳送失常鬱火燥熱煎成結糞滯於大小腸之間阻氣不運而作痛者宜以枳實導滯丸脩急大黃丸之類先通其滯止其痛然後用四物等生血潤燥之劑以治其本外有卒然心腹大痛欲吐不得吐欲瀉不得瀉唇青厥逆死在頃臾此內因食積外感寒邪是名乾霍亂之候也宜急以鹽湯灌之而以鵝翎探吐取涎而愈若夫清痰留滯于膏腹之間食積鬱結於腸胃之內皆能令人腹痛清痰作痛者控涎丹小胃丹之類食積為患者保和丸枳朮丸之類消之枳實導滯丸木香枳榔丸之類下之濁氣在上者湧之清氣在下者提之寒者溫之熱者清之虛者培之實在瀉之結者散之留者行之此治法之大要也學者詳之

脉法

脉經曰脉細小緊急病速進在中腹中刺痛

陰弦則腹痛 弦急小腹痛 尺脉緊濟下痛

尺脉伏小腹痛癥疝 尺脉實小腹痛當利之

心腹痛不得息脉細小遲者生脉大而疾者死

腹痛脉反浮大而長者死

方法

丹溪方法
九十五條

丹溪曰腹痛有寒有積熱有食積有痰有死血脉弦者多屬

食宜溫散之蓋食得寒則滯得熱則行更宜以行氣則氣

藥若助之無不愈者○脉滑者是痰痰因氣滯而聚阻礙道

路氣不得宣通而痛宜導痰解鬱○九痛必用溫散以其

下鬱結不行阻氣不運故也○臍不忽大痛人中黑色者多

死○腹中水鳴乃火擊動其水也

戴氏曰痛甚便欲大便去後則痛減者是食積也結滯痛而無增減者是寒也特痛將止者是熱也其痛有常處而不移動者是死血也

○治腹痛用台芎蒼朮香附白芷為末姜汁入湯調服

○白芍藥止能治血虛腹痛餘俱不治以其酸寒收斂而別無溫散之功者也

○如飲食過傷而腹痛者宜木香枳榔下之

○如氣虛之人傷飲食而腹痛宜調補胃氣併消導藥用人參

白朮山查神麴枳實麥芽木香砂仁之類

○如腹中常有熱而痛此為積熱宜調胃承氣湯下之

○小腹實痛用青皮以行其氣

○小腹因寒而痛宜肉桂吳茱萸

○因寒氣作痛者宜小建中湯加乾姜官桂台芎蒼朮白芷附香

已上

垣東

垣東

○因熱而痛者二陳湯加黃芪黃連梔子痛甚者加炒乾姜從

○若腹痛不禁下者宜川芎蒼朮湯以治之川芎蒼朮香附白

芷茯苓滑石加姜水煎服

○高良姜湯治因寒心腹大痛

高良姜二錢 厚朴姜制 官桂各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱服

○草薢湯治臍腹虛脹作痛

澤瀉一錢 木香三分 神麴四分 半夏

枳實熱炒黃色 草薢仁 黃芪春用 益智仁

甘草炙各錢 青皮 陳皮各六分 川歸七分

茯苓七分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

垣東

○益胃散治因服寒藥過多致嘔不止痛

人參

厚朴

甘草

白朮

姜黃

乾姜

砂仁

澤瀉已上各三分

智智六分

陳皮七分

黃芪七分

右細切作一服加姜水煎服

垣東

○厚朴溫中湯治胃虛寒脹滿疼痛用厚朴陳皮各一錢

茯苓

草薢

甘草

木香各半錢

乾姜三分半加姜水煎服之

間河

○六合散又名金鑰匙治一切燥熱鬱結汗後餘熱宣轉不通

併治小腸氣結心腹滿悶膏中痞結走注疼痛

大黃

一兩酒拌溫蒸白朮半兩

黑丑畧炒

甘遂各半兩

枳實

三錢生輕粉一錢

問河

右為細末每服一錢蜜水調下量虛實加減服

○沒藥散治一切心腹疼痛不可忍者

沒藥

研另

乳香

另研各

穿山甲

五錢

唐

灰火煨胖

木鱉子

四錢去壳

右為細末每服半錢或一錢酒大半盞煎三五沸服

問河

○木香枳榔丸治食鬱氣滯作痛

木香

三錢

枳榔

三錢

青皮

五錢

陳皮

五錢

麥蘖麪

炒七錢

枳實

麪炒黃色六錢

白朮

五錢

厚朴

姜制四錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸溫水

下食遠

問東

○枳實導滯丸治食傷溫熱之物不得施化腹痛滿悶不安以
利為度

方見內傷門

○桂枝加

芍藥湯

治腸滿時

痛脉弱此即

傷寒門桂枝

湯內加芍

藥一錢

○小建中湯

治傷寒陽脉

瀋陰脉弦腹

中急痛者

桂枝甘草炙

人活

問阿

恒東

○瓜蒂散治食傷太陰填塞悶亂不快甚則心胃大痛兀兀欲

吐者方見中風門

○霹靂散治腹痛脉微欲絕

附子

一枚炮取出以冷灰焙之去皮研

右以一味取五錢重入真臘茶一錢同研細為末分作二

服每服用水一盞煎七分去粗入蜜一匙稍冷服

○酒煮當歸丸治小腹寒痛及婦人白帶疝癰大寒等証

茴香五錢

黑附子炮

良姜各七錢當歸一兩

右四味細切以上好無灰酒一升半煮至酒乾盡焙乾入後藥

炙甘草

苦練生用

丁香各五錢木香

升麻各一錢

柴胡二錢

炒黃鹽

金燭各三錢

各三分白芍

藥六分大棗

三枚生姜二錢

阿膠炒令

右剉水煎

服

○真武湯治

腹痛下痢四

肢沉重方見

傷寒門

石三方治人

乃有異本無此

今故今人于此

正傳

卷之四

八

玄胡索四錢

右與前四味同研為細末酒煮麴糊為丸如梧桐子大每

服五七十九空心淡醋湯下忌油膩冷物及酒溫麴

○黃連湯治膏中有熱胃中有邪氣腹內痛甚時欲嘔吐此藥

升降陰陽

黃連

甘草炙

乾姜

桂枝各五錢

人參二錢

半夏

半合湯泡七次去皮

右細切入大棗二枚量水煎服

○芍藥甘草湯治四時腹痛

白芍藥

甘草炙

各等分每服五錢細切入生姜三片水一盞半煎至一盞

溫服○醫聖元戎云腹痛脉弦傷氣用本藥○脉洪傷金

加黃芩○脉緩傷水加桂枝○脉瀉傷血加當歸脉遲傷

寒加乾姜

○加減小柴胡湯治寒熱脉弦腹痛本方去黃芩加白芍藥

○四物苦練湯治濟下虛冷腹痛

四物湯錢六加玄胡索苦練各一錢半

右細切水二盞煎至一盞溫服

○增損當歸丸治三陰受邪心腹疔痛

四物湯五錢防風獨活全蝎各五錢

續斷茴香各一两苦練玄胡索

木香丁香各二錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下

○苦練丸治奔豚小腹作痛方見疝氣門

○一捏金散治臍腹大痛及奔豚小腸氣等証

玄胡索

川練子

全蝎去毒炒茴香

各等分為細末每服二錢七熱酒調下神驗

○丹溪活套云凡腹痛多是血脉凝滯不行必用酒炒白芍藥
惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃柏○如腹痛欲以物拄按
者屬虛用人參白朮乾姜官桂之類○如腹痛手不可按
者屬實宜用建中湯加大黃或調胃承氣湯加桂枝類下
之而愈○如因飲食過傷而作痛者必問因傷何物如傷
生冷硬物而作痛者東垣木香見睨丸山稜稍積丸之類
如傷熱物而作痛者枳實導滯丸三黃枳朮丸之類看強
弱緩急用而下之○如氣虛之人因飲食過傷而腹痛者
宜補瀉兼施用二陳湯加川芎白朮神麴麥芽人參蒼朮

之類或送下前推積等丸子以下之○如腹中常覺有熱而暴痛暴止者此為積熱宜調胃承氣湯之類下之○如因跌撲損傷而作痛者此瘀血証宜桃仁承氣湯抵當湯之類逐去其血卽愈○如因事損傷或酒後涉水血凝腹痛者大承氣湯加桂

一黃氏婦年五十餘小腹有塊作痛二月餘一醫作死血治與四物加桃仁等藥不効又以五靈脂玄胡索乳香沒藥山稜莪朮等作丸服又不効召予治診其六脉皆沉伏兩尺絕無予曰乃結糞在下焦作痛耳非死血也用金城稻藁燒灰淋濃汁一盞服之過一時許與枳實導滯丸一百粒催之下黑糞如梅核者一碗許痛遂止後與生血潤腸之藥十數貼調理平安

一壯年男子寒月入水網魚飢甚遇涼粥食之腹大痛二晝夜不止一醫先與大黃丸不通又與大承氣湯下糞水而痛愈甚召予治診其六脉皆沉伏而實面青黑色予曰此大寒証及下焦有燥屎作痛先與丁附治中湯一貼又與灸氣海穴二十一壯痛減半繼以江子加陳香木香作丸如菴豈大生姜汁送下五粒下五七次平安

腰痛三十二

論

內經曰足大陽脉令人腰痛引項脊尻背如腫狀少陽腰痛如以針刺其皮中循循然不可以俛仰不可以顧陽明腰痛不可以顧顧如有見者善悲足少陰腰痛痛引足內膝厥陰腰痛腰中如張弓弩弦太陰腰痛下如有橫木居其中繼則甚

遺洩又曰太陽所至為腰痛巨陽虛則腰背頸項痛是動則
病項如拔俠脊痛腰似折髀不可以曲又曰腰者腎之府轉
搖不能腎將憊矣脉經曰凡有所用力舉重若入房過度汗
出如浴水則傷腎腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛又有腎
着之病從腰以下冷腰重如帶五千錢若夫腰痛之証雖有
六經見候之不同挫閃腎之或異或瘀血或風寒或濕痰流
注種種不一原其所由未必不因房室過度負重勞傷之所
致也經曰邪之所湊其氣必虛是也治法虛者補之杜仲黃
栢肉桂當歸五味兔絲子天門冬熟地黃之類風者散之麻
黃防風羌活獨活之類寒者溫之肉桂乾姜附子之類挫閃
者行之當歸蘇木乳香沒藥桃仁紅花之類瘀血者逐之大
黃牽牛桃仁水蛭蠅虫之類濕痰流注者消導之蒼朮蕪荳

香附白朮枳實橘紅半夏茯苓之類宜各類推而治之不可執一論也

脉法

脉經曰尺脉沉腰背痛凡腰痛時時失精飲食減少其脉沉滑而遲此為可治

腰痛之脉皆沉弦沉弦而緊者為寒沉弦而浮者為風沉弦而濡細者為濕沉弦而實者為挫閃

丹溪曰脉必沉而弦沉為滯弦為虛濇者是瘀血緩者是濕滑者伏者是痰大者是腎虛也

方法

丹溪方去
凡七條

丹溪曰有腎虛有瘀血有溫熱有剋閃有痰諸腰痛不可用補氣藥亦不宜峻用寒涼藥

○腎虛腰痛用杜仲黃柏龜板知母枸杞子五味子猪脊骨髓

丸服

○瘀血宜行血順氣用補陰丸加桃仁紅花外用三稜針於委中穴出血以其血滯於下也

○濕宜燥濕行氣用黃柏杜仲蒼朮川芎之類

藏氏曰底之不已為腎虛也日輕夜重者是瘀血也遇天陰及久坐而發者是濕也

○痰宜南星半夏加快氣藥佐之使痰隨氣運

○腰曲不能伸者針人中立愈

○腎着為病其体重腰冷如冰飲食如故小便自利腰以下冷痛而重治宜流濕痺用溫藥

○腎着湯治腎着腰痛

乾姜炮

茯苓各半

甘草炙半

白朮二錢

國產金剛石

破故紙炒一斤

○三因立安丸治五腫腰痛常服溫補腎元壯健腰脚

革解 二兩

續斷各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九溫酒下

○補骨脂丸治腎虛及寒濕一切腰痛

海濱一兩用鹽湯浸

八兩
另研
如去
泥汁

右以前三味細研為末不犯鐵器入胡桃肉用木杵搗千

餘下以糯米糊為丸秋冬以煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九空溫酒下乾物壓之

○獨活湯治勞後腰痛如折

羌活

防風

獨活

澤瀉

肉桂各三錢

大黃

酒浸

甘草

各二錢

川歸

五錢

連翹五錢

防已

酒炒

黃柏

酒炒各二錢

桃仁

三十

每服一

兩酒水煎服

○摩腰丹治寒熱腰痛

附子尖

烏頭尖

天南星

各二錢

硃砂

乾姜

各一錢

雄黃

樟腦

丁香

各一錢

半

射香

當門子五粒

右為末蜜丸如龍眼大每用一丸生薑汁化開如厚粥樣

方局

烘熱置掌中摩腰上冷盡粘着肉烘綿衣縛定腰熱如火
間三日用一丸妙或加吳茱萸桂皮
○煨腎丸治腎虛腰痛

杜仲

三錢炒
絲斷

右為細末以猪腰子一隻薄批作五七塊以椒鹽淹去腥
水搽藥末在內以荷葉包裹更加濕紙二三重外包慢火
煨熟食之無灰酒送下

丹溪

○補腎丸治腎虛腰痛方見虛損門
○蒼朮湯治濕熱腰腿疼痛

防風

黃柏各一錢 柴胡二錢 蒼朮三錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

東垣

○川芎肉桂湯治瘀血在足太陽足少陰足小陽三經腰痛酒

漢防已

防風

去若各三分

炒神麴

獨活

各五分

川芎

柴胡

肉桂

當歸稍

炙甘草

蒼朮

各一錢

羌活

一錢半

桃仁

五箇去尖另研細

河間

○地龍散治腰脊痛或打撲損傷或從高墜下惡血在太陽經

令人腰脊痛或脾股脛膕中痛不可忍

當歸稍

二分

中桂

地龍

各四分

麻黃

五分

蘇木

六分

獨活

黃柏

鹽酒炒

甘草

各八分

羌活

一錢二分

桃仁

六箇去皮尖另研如泥

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

東垣

○粘痛湯治濕熱為病肩背沉重肢節腰脇疼痛背膈不利

白朮

四分

人參

去芦

升麻

苦參

酒炒

葛根

蒼朮

各五分

防風

去芦

知母

去毛酒洗

澤瀉

黃芩

猪苓

去皮

當歸

各六分

炙甘草

生黃芩

酒洗

茵陳

酒炒

羌活

各八分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

東垣

○蒼朮復煎散治寒溫相合腦後痛惡寒項筋脊骨強肩背膝

眼痛腰痛膝臍痛無力行步沉重

紅花

分一

黃柏

分三

柴胡

去芦

葉本

澤瀉

白朮

升麻

各五分

羌活

一錢

蒼朮

四兩

右細切先以蒼朮一味用水二大盞煎至二盞去粗入前

藥復煎至一盞去粗空心稍熱服取微汗為効忌酒及寒濕

一粒金丹治腰膝走注疼痛如虎咬之狀不可忍者

問

慾

草烏頭

五灵脂

各四兩

木鱉子

去壳

白膠香

二兩

地龍

去泥土半一兩

京墨

二錢半

乳香

二錢半

當歸

五錢

浸藥

五錢

射香

二分半

右為細末再研千餘下糯米糊丸如梧桐子大每服一九

或二九多至三九溫酒下服藥後微汗神驗

○元戎加味四物湯治瘀血腰痛

本方加桃仁泥酒紅花二味煎服

○三因安腎丸治腎虛腰痛

破故紙

炒

胡芦芭

炒

茴香

炒

川芎

炒

續斷

炒各三兩

桃仁

炒

杏仁

炒

山藥

茯苓

各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九粒溫湯下

因三

○如神湯治剋閃腰痛甚者不過三服平安

川歸

肉桂

玄胡索

各等分

右為細末每服二錢七熱酒調下或細切酒煎亦可

因三

○獨活寄生湯治因腎虛坐卧冷濕當風所得

獨活

一錢

桑寄生

杜仲

炒

細辛

牛膝

秦艽

茯苓

白芍藥

桂心

川芎

防風

炙甘草

人參

熟地黄

當歸

各五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服

○五積散治寒濕及清痰流注經絡腰膝背脇疼痛

白芷

川芎

桔梗

芍藥

陳皮

厚朴

茯苓

甘草

麻黃

乾姜

官桂

川歸

半夏

蒼朮

枳殼

各五分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○丹溪活套云凡因房勞辛苦而腰痛者四物湯加知母黃柏
五味子杜仲之類吞補腎丸或大補陰丸○因風寒濕流
注經絡而作痛者二陳湯加麻黃蒼朮川芎白芷防風羌
活獨活之類○因閃跌撲致死血流于本經而作痛者
四物湯加桃仁紅花蘇木之類脉實人壯盛者大承氣湯
加桂下之安○有因醉飽入房太甚而酒食之積乘虛流
入於本經致腰痛難以俛仰四物湯合二陳湯加麥月神芽
麴杜仲黃柏官桂砂仁葛花枳梗之類

芽

脇痛三十三

論

內經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之又曰怒則氣逆虛則嘔血及飡泄故氣上矣蓋心出血肝納血因大怒而血不歸經或隨氣而上出於口鼻或留於本經而為脇痛又或歲木太過而木氣自甚或歲金有餘而木氣被鬱皆能令人脇痛經曰病脇下滿氣逆二三歲不已病名曰息積是亦肝木有餘之証也外有傷寒發寒熱而脇痛者足少陽膽足厥陰肝二經病也治以小柴胡湯無有不効者或有清痰食積流注脇用而為痛者或有登高墮仆死血阻滯而為痛者又有飲食失節勞役過度以致脾土虛乏肝木得以乘其土位而為胃脘

當心而痛上支兩脇痛膈噎不通食飲不下之証醫者宜於各類推而治之母認假以為真也

脉法

脉經曰肝脉搏堅而長色不清當病墜墮若搏因血在脇下令人喘逆若軟而散候濡軟古通用其色澤者當病溢飲溢飲者暴渴多飲而溢入於肌膚腸外也

肝脉沉之而急浮之亦然若脇下痛有氣支滿引小腹而痛時小便難苦目弦頭痛腰背痛足為逆寒時瘡婦人月水不来時無時有得之少時有所墜墮

脉双弦者肝氣有餘兩脇作痛

方法

丹溪曰屬肝木氣實

因怒氣大逆肝氣鬱甚謀慮不決風中於肝皆使木氣大實故火盛肝氣急也

有死血

因惡血停留於所否於下而痛病則自所痛甚按之益甚也

痰流注

因痰積流注於厥陰之經亦能使脇下痛病則咳嗽氣急引血痛

○當歸龍會丸瀉肝火大盛之要藥因內有溫熱而脇痛甚伐

肝木之氣肝實宜之

當歸

龍胆草

梔子仁

黃連

大黃

酒浸瀉火

蘆薈

青代

各五錢

木香

二錢半

射香

二分

右為細末神麴糊丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下

○一方加柴胡五錢青皮一兩熱甚者烘熱服

○一方木氣實者用川芎蒼木青皮為藥柴胡甘草龍胆草各

等分水煎服

○左金丸瀉肝火行溫為熱甚之反佐

黃連六錢 吳茱萸一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豈大每服三五十九淡姜湯下

裕冊

○一方破血行氣治死血作痛之証

桃仁

去皮留尖另研

紅花

酒拌

川芎

香附童便浸

青皮各等分右細切水煎服之

裕冊

○加味二陳湯治溫痰流注脇內作痛

本方加 南星蒼朮川芎姜水煎服

裕冊

○肝苦急急食辛以散之用撫芎蒼朮或用小柴胡湯蓋本方

為脇痛發寒熱者必用之要藥也

裕冊

○左脇痛以柴胡為君加佐使藥川芎青皮草龍胆之類

裕冊

○兩脇走痛或用控涎丹

因清痰涎注作痛者可用蓋痰在

經前

經中

經後

經前

經中

經後

○治咳嗽脇痛者二陳湯加南星青皮香附青代姜汁一云四

物湯加青皮等藥以疎肝氣

○氣弱之人脇下痛脉細緊或弦多從勞役怒氣得之八物湯

加木香清皮或加桂心水煎服之

○去滯氣用青皮蓋青皮乃肝胆二經藥人多怒脇下有贅積

固宜以解二經之實者若二經氣血不足先當補血氣少

加青皮可也此承上條意思言也

○肥白人氣虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣柴胡黃芩退熱

木香青皮調氣

○瘦弱人寒熱脇痛多怒者必有瘀血宜桃仁紅花柴胡青皮

大黃之類行之

○發寒熱脇痛似覺有積塊必是飲食太飽勞力所致必用龍

膏丸治之

○解痛治標藥外用琥珀膏貼之○又方用芥菜子水研付○又方以吳茱萸研水調付○又方以韭菜葉搗細炒熱貼而以熨斗盛火熨之

○推氣散治右脇痛甚脹滿不食

片姜黃

枳殼

麩炒

桂心

各五錢

甘草

炙三錢

右為細末每服二錢姜湯調下水煎亦可

○枳芎散治右脇疼痛不可忍

枳實

麩炒

川芎

各五錢

甘草

炙一錢半

右為細末每服二錢姜棗湯或酒調下

○吳茱萸散治腹脇膨脹痞悶噎塞腹脇疝痛

吳茱萸

益智仁

甘草

荆三稜

各

問河

青皮

陳皮各五分 石蓮肉

厚朴姜制三分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚白鹽少許水一盞半煎至一盞去粗溫服

○分氣紫蘇飲治腹脇疼痛氣促喘急

五味子

桔梗去芦

紫蘇葉

桑白皮蜜炙黃色

草薢仁

陳皮去白

大腹皮酒洗

茯苓

甘草

炙各半錢

右細切作一服加生姜三片白鹽少許水一大盞煎七分

去粗空心溫服

○芎藭湯治脇下疼痛不可忍

桂枝

川芎

細辛

乾葛

防風

去芦各八分

芍藥

枳殼

麻黃

人參

并草灸各四分

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○丹溪活套云凡脇痛者多是肝木有餘也宜用小柴胡加青

皮川芎芍藥草龍胆甚者煎成正藥入青代射香 ○痰

流注者本方倍半夏加橘紅南星蒼白朮茯苓川芎之類

○瘀血作痛者小柴胡合四物湯加桃仁紅花或乳香沒

藥煎服痛甚而元氣壯實者桃仁承氣湯下之而愈○性

急多怒之人時常腹脇作痛者小柴胡加川芎芍藥青皮

之類煎服甚者以煎藥送下當歸龍會在其効甚速

○金氏子年四十餘因騎馬跌僕次年左脇脹痛醫與小柴胡

湯加草龍胆青皮等藥不効來求治診其脉左手寸尺皆

弦數而瀋閑脉芤而急數右三部惟數而虛予曰明是死

血証用抵當丸一劑下黑血二升許後以四物湯加減調理而安

諸氣三十四

論

內經曰百病皆生於氣也故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炆則氣泄驚則氣亂憂則氣沉一曰勞則氣耗思則氣結夫人身之正氣與血為配血行脉中氣行脉外一呼脉行三寸一吸脉行三寸氣血並行周流乎一身之中灌漑乎百骸之內循環無端運氣不悖而為生生不息之妙用也經曰一息不運則機絀窮一毫不續則窮壞判若內無七情之所傷外無六淫之所感何氣病之有哉其不善攝生者五志之火無時不起五味之偏無日而不傷是以釀成膠痰

固積留滯於六府鬱火和氣充塞乎三焦使氣血失其常候
府藏不能傳導是故外邪得以乘虛而湊襲矣以致清陽不
升濁陰不降而諸般氣痛朝輟暮作而為膠固之疾非良工
妙手莫易治焉若夫為脇痛為心腹痛為周身刺痛甚則為
反胃為膈噎等証即此之由也大抵男子屬陽得氣易散女
人屬陰遇氣多鬱是以男子之氣病者常少女人之氣病者
常多故治法曰婦人宜調其血以耗其氣男子宜調其氣以
養其血此之謂也學者宜致思焉

脉法

脉經曰脉滑者多血少氣濇者少血多氣大者血氣俱多脉
來大而堅者血氣俱實小者血氣俱少

脉來細而緩者血氣俱虛 代者氣衰 細者氣少

浮而絕者氣欲絕

辟大而滑中有短氣

尺脉濇而堅為血實氣虛尺脉細而微血氣俱不足也

劉立之曰下手脉沉便知是氣沉極則伏濇弱難愈甚

或沉滑氣兼痰飲病也

方法

丹溪方法
凡六條

丹溪曰周流乎一身以為生者氣也苟內無所傷外無所感何氣病之有今冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而轉成劇病急方倒用辛香燥熱之劑以火制火各將誰執又曰氣無補法世俗之論也以其為病痞滿壅塞似難於補不思正氣虛者不能運行邪滯着而不出所以為病經曰壯者氣行則愈怯者着而為病苟或氣怯不用補法氣何由行又曰冷生氣

者出於高陽生之謬言也病人自覺冷氣從下而上者非真冷也蓋上升之氣自肝而出中挾相火自下而上其熱為甚火極似水陽亢陰微又曰凡氣有餘便是火是皆為治之正論也可不究與

○調氣用木香然木香味辛氣能上升如氣鬱而不達固宜用之若陰火衝上而用之則反助火邪而病甚矣故當用黃柏知母而少用木香佐之

○稟受素壯而氣刺痛當用枳殼烏藥若因氣不舒而刺痛當用木香調達之

○若肥白人氣刺痛者宜與人參白朮加枳殼木香

○一方解五藏諸氣益少陰經血用梔子炒令將黑為末以生薑汁入湯同煎飲之其効甚捷

○清膈丸治因溫熱氣滯

黃芩

黃連各五錢

香附一兩

蒼朮二兩

右為細末新取紅熟皮姜去皮搗爛和丸如棗豈大每服三五十九白湯下

河間

○正氣天香湯治婦人一切諸氣作痛或上湊心胃或攻築脇助腹中結塊發渴刺痛月水因之而不調或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前產後一切氣候並皆治之

烏藥一錢半

香附六錢

陳皮

紫蘇

乾姜

各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗稍熱服

○子和木香枳榔丸此藥流溫潤燥推陳致新滋陰抑陽散鬱破結活血通經治男子婦人嘔吐酸水痰涎不利頭目昏眩併一切酒毒食積及米穀不化或下痢膿血大便秘塞

風壅積熱口苦煩渴涕唾稠粘膨脹氣滿等証

木香

檳榔

青皮 去穢

陳皮 去白

黃柏

炭或煨

枳殼

黃連

大黃

黑丑

香附 各一兩 當歸 一兩半

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十丸溫水以

利為度

○蘇合香丸大能順氣化痰併治傳屍骨蒸勞瘵卒暴心痛小

兒驚搐大人中風卒死等証

沉香

射香 另研

訶子 煨去核 丁香

木香

安息香 另研為末用無灰酒一升煮為膏

華撥

白朮

白檀香 各一兩 薰陸香 另研

蘇合油

和入安龍腦 另研各一兩

硃砂

另研飛 烏犀角 各五錢

方局

右為細末研極勻入安息膏及煉蜜和勻丸如梧桐子大
空心溫酒化下四丸白湯亦可

○蘇子降氣湯治氣不升降痰涎壅塞氣滿氣痛等証

川歸去頭

甘草炙

前胡去芦

厚朴

姜制各半錢

肉桂

去皮

陳皮

去白各七分半

半夏

紫蘇子

另研各一錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一
盞去粗不拘時服

方局

○異香散治胃氣不和飲食不化腹脇膨脹一切冷氣結聚作
痛等証方見脇痛門

方局

○沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降膏膈痞悶噎膈吞酸

沉香

四錢

砂仁五錢

甘草

炙一兩二錢

香附

薑浸一宿

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調下

○復元通氣散治跌撲損傷或負重到閃致氣滯於血分作痛

併一切氣不宣通瘀血凝滯周身走痛等証

舶上茴香炒穿山甲唐炙木香各一兩玄胡索

白丑 甘草炙 陳皮去白各一兩 當歸半一兩

今加乳香 沒藥

右為細末每服二錢熱酒調下不飲酒人白湯下病在上

食後病在下食前服

○木香流氣飲治諸氣痞塞不通胃膈膨脹面目虛浮四肢腫

滿口苦咽乾大小便不利

藿香葉 木香不見火 厚朴姜制 青皮去白

香附去毛童 麥門冬去白 白芷各七分 甘草五分

陳皮去白 大腹皮酒洗 乾木瓜 人參去芦

蓬莪朮

煨

丁香皮

不見火

半夏

湯泡各二分

赤茯苓

去灰

石菖蒲

各三分

草薢仁

五分

紫蘇葉

枳殼

白朮

肉桂

木通

各六分

沉香七分半

右細切分作二服每服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗服

○丹溪活套云蒼天之氣貴乎清淨若浩然充塞乎宇宙之間以為生生不息之運用者此一元之正氣也彼為雲為霧為風雷為雷霆鼓舞於天地之間者皆山澤溫熱鬱蒸之氣也在人者亦由是焉其清純之元氣與血並行循環無端未嘗有盈虧也彼衝擊橫行于藏府之間而為痛為痞滿為積聚等証者亦由天地間雲雷之鼓舞因溫熱鬱蒸而發者也溫熱鬱蒸之久在天地則為霖雨雹雪等物在

人身者為積聚為痰癖為痰氣痞滿之類治之之法在胃臆之間而為痞滿刺痛伏梁等証者二陳湯加枳實黃連桔梗瓜蒌仁木香之類在下焦而為奔豚七疝等証者本方加桃仁山查梔子枳核茴香川煉荔枝之類在兩脇攻築作痛者本方加青皮柴胡芍藥草龍胆之類在中焦而為痞滿脹急者本方加木香厚朴枳榔枳殼或用平胃散以平其敦阜之氣惟婦人胎前產後一切氣疾作楚者俱用四物湯為主治加疎利行氣之藥此治氣之大法也學者宜細詳之

疝氣三十五

論

內經曰肝脉大急沉皆為疝又曰三陽急為瘕三陰急為疝
雖經曰任脉之為病其內苦結男子為七疝夫所謂七疝者
寒水疝血氣凝滯七者是也予和曰寒疝者囊冷結硬如石
陰莖不舉或控筆丸而痛得之於坐卧濕地或寒月涉水或
值雨雪或坐卧得石或風冷處使內過房宜以溫劑下之夕
而無子水疝者其狀腎囊腫痛墜汗而出或囊腫狀如水晶
或囊痒而搔出黃水或小腹橫之作水聲得之於飲水醉酒
使內也勞汗出而過風寒濕之氣聚於囊中故冰冷令人為
卒疝宜以逐水之劑下之外有漏注誤不錄筋疝者其狀陰莖腫
脹或潰而為膿裏急筋縮或莖中作痛痛極則痒或挺縱不

時

收或出白物如精隨洩而下得之於房室勞傷及邪術所使
宜以降心火之劑下之血疝者其狀如黃瓜在少腹兩傍橫
骨兩端約紋中俗名便癰得之於重感春夏大燠勞於使內
氣血流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多宜以和
血之劑下之氣疝者其狀上連腎臍下及陰囊多得於號哭
忿怒則氣鬱之而脹號哭怒罷即氣散者延也有一治法以
針出氣而愈蓋針有得失宜以散氣之藥下也或小兒亦有
此疾俗名偏墜得之於父已年老或年少多病陰痿精怯強
力入房因而有子稟胎病也此証難治惟禁房一穴有灸之
而愈者考此宜狐疝者其狀如仰瓦卧則入少腹行立則出
腹入囊中如狐晝出穴而溺夜入穴而不溺此疝出入往來
上下正與狐相類也亦與氣疝大同小異宜以逐氣流經之

劑下之癰疽者其狀陰囊大如升斗不痒不痛者是也得之於地氣卑溫故江淮之間多有之宜以去溫之劑下之女子陰戶凸出雖亦此類乃熱則不禁固也不可便認為虛寒而溫之補之本名曰痃宜以苦藥下之以苦堅之愚按手和論七疔病源至為詳悉但其處方一以攻下之法為主治不能使人無疑耳既曰多由房勞致虛而作其可一例施之以攻下之法乎大抵七疔為病若非房勞所致即是遠行辛苦涉水履水熱血得寒而凝滯於小腸膀胱之分或溫熱乘虛而流入於是厥經之經古方一以為寒而純用烏附等熱藥為治我丹溪先生獨斷為溫熱此發古人之所未發者也夫熱鬱于中而寒束于外宜其有非常之痛故治法宜驅逐本經之溫熱消導下焦之瘀血而以寒因熱用之法立方處治即

少陰脉滑
則病肺風
太陰脉
滑

邪易伏而病易退也其攻下之法愚故未敢試而行之以俟
識者再論學者宜致思焉

脉法

內經曰肝脉大急沉皆為疝心脉滑搏急為心疝

肺脉沉搏為肺疝○又三陽急為癢三陰急為疝○又則
病脾風疝陽明脉滑則病心風疝太陽脉浮則病腎風疝
少陽脉浮則病肝風疝

脉經曰寸口脉弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒緊
則不欲食弦緊相搏則為寒疝

跌陽脉浮而遲浮則為風虛遲則為寒疝繞臍痛者發則
自汗出手足厥寒其脉沉弦者烏頭湯主之

方法

所溪方去
九十三條

丹溪曰疝氣者羣丸連小腹急痛也有痛在羣丸者有痛在五
五疝穴遠者皆足厥陰之經也或無形或無聲或有形如
瓜或有聲如蛭自素問而下皆以為寒蓋寒主收引經絡
得寒則收而不行所以作痛然亦有陽水涉水終身不病
此者無熱故也大抵此証始於溫熱在經鬱而至又得
寒氣外束不得疎散所以作痛若只作寒論恐為未備或
曰厥陰經鬱積溫熱何由而致予曰大勞則火起於筋醉
飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝積之
父母能令子虛溫氣便盛濁液凝聚併入血緣流于厥陰
厥陰屬木係于肝為將軍之官其性急速火性又暴為寒
所束宜其痛之太暴也有以烏頭旋子作湯服之其効亦
捷後用此方隨形証加減與之無不驗但溫熱又當分多

少而治溫則腫多癰病是也又有挾虛而發者當以參朮為君疎導藥佐之脉甚沉緊而豁大無力者是也其痛亦輕但重墜牽引耳專主肝經與腎絕無相干切不可下劫藥神効蓋溫熱因寒鬱而作用梔子以降溫熱為頭以破寒鬱况二物皆下焦之藥而為頭為梔子之所引其性急速不容胃中停留也又謂投之不痛者為虛須加肉桂以姜汁丸服

○一方定疝痛用海石香附為末姜汁調下

○又方治諸疝定痛速効用枳殼梔子糖菰即山查葉萸各炒溫盛者加荔枝枝炒為末丸服或用長流水調末子空心服

一二錢一本有川棟子

○又方治食積與瘀血成痛者一云少腹痛者有瘀血及有積熱者

梔子仁

桃仁

山查

枳實

茱萸

右為末順流水入姜汁作湯調服

○又方治陽明經受溫熱傳入大腸惡寒發熱少腹連毛際結核悶痛不可忍用山梔桃仁枳殼並炒山查等分入姜汁煎熱服

○按之不痛者屬虛必用桂枝山梔子炒烏頭炮右件為細末姜汁打糊丸為梧桐子大每服四五十九丸却痛効

○一方治癰腰痛者一本治腰不痛者蒼朮南星白芷山查半夏川芎枳實神麴糊丸服

○諸疰發時用海石香附二味為末生薑汁入湯調服亦治心痛因積痰而作痛者

○又治疰方橘核炒桃仁研梔子炒茱萸炒川烏炮水煎服

小腸氣腎核脹痛蒼朮陳皮川練子各半甘草錢半紫蘇牛一錢

細切酒水各一盞連煎葱白五莖煎服

○劫疝藥用烏頭枳子炒搗細順流水入姜汁調服

○陰囊腫脹大小便不通

白牽牛二兩

桑白皮

白朮

木通去節

陳皮各半兩

右為細末每服二錢姜湯調下空心服

○凡疝氣挾虛者必以枳朮為君佐以疎道之藥如川練子茴香枳實山查梔子之類

○三因葱白散治一切寒疝作痛

川芎

當歸

枳殼炒

厚朴炒

官桂

青皮

乾姜

茴香炒

茯苓

川練

麥蘖炒

神麩炒

三棱地

莪朮地

熟地黃

白芍藥

木香

人參各等分

右細切每服五錢加葱白三莖鹽少許水煎空心溫服

附丹

○又方桃仁十四箇拘橘子十四箇瓦上炒山梔子九枚去吳茱萸七十粒山查子十四箇並炒生薑一指大搗細以順

流水一鍾盪起煎數沸連粗服

梔

附丹

○又方治癰不痛丹蒼朮神麴白芷山查川芎枳子半夏入姜煎服

附丹

○凡癰証非痛斷房事與厚味不可用藥

○凡治七疔須先灸大敦穴

一名大頓在足大姆指離爪如韭葉大灸三壯足厥陰井也

○治疔氣神方其病甚至氣上衝如有物築塞心臆欲死手足

冷者二三服除根

硫黃不拘多少火中溶化荔枝核為末炒焦黃色陳皮
 右三味各等分為末飯丸如梧桐子大每服十四五丸酒
 下其痛立止自已覺疼甚不能支持畧用五六丸再不可
 多也

○又治疝方

蒼朮

香附

各鹽炒

黃柏

酒炒已為君

青皮

去穢

玄胡索

益智

桃仁

已上為臣

茴香

附子

鹽炒

甘草

炙已上為使

右細切每服五錢順流水煎服

○五葉湯洗疝痛立効

枇杷葉

野紫蘇葉

椒葉

蒼耳草葉

水晶蒲桃葉

經

右五味不拘多少量水煎湯俗洗

○一方肥人腫疔作痛發熱惡寒

五苓散加茴香煎服神驗

經

○吳茱萸湯治厥疔腹中冷痛積氣上逆致陰冷囊寒

吳茱萸

半錢

川烏頭

炮去皮

細辛

各半

良姜

當歸

乾姜

炮

官桂

各二

經

○茴香練實丸治控辜小腸痛結上而不下痛衝心膈

茴香

炒

練實

去核炒

食茱萸

陳皮

各一兩

馬蘭花

醋炒

羌花

醋炒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服十九至二十九空

心溫酒下

室

○疾藜湯治陰疝牽引小腹諸厥疝即陰疝也喜欲房勞痛

不可忍

疾藜去刺炒

附子

炮去

疾藜

梔子仁

各一錢

右細切作一服水一盞煎至六分食前溫服亦治前控

証

東垣

○木香散治心疝小腹痛悶絕不已

木香

陳皮

各半錢

良姜

訶子皮

赤芍藥

枳實

各半

草薢

川芎

黑丑

各二分

右細切水一盞煎七分去粗溫服

方

○香殼散治小腸氣臍腹疔痛筋急陰股中痛悶暈不省人事

舶上茴香

炒

枳殼

炒

各

浸藥

半兩

右為細末每服一錢溫酒調下不拘時併進二三服効

○寶鑑沉香桂附丸治中氣虛弱甚脾胃虛寒歲府積冷心腹

疼痛手足厥逆冷便利無度亡疝引痛喜熱物熨湯証

沉香 附子炮

川烏炮 乾姜炮

良姜 官桂 吳茱萸湯炮去苦 茴香炒各一兩

右為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十九至七十丸空心米飲下

○元戎加味五苓散治疝氣卒腹小便秘澀痛

本方加川練子一分

右為細末每服二錢空心米飲調下

○茴香練實丸治陰疝痛不可忍及小腸氣痛

川練子炒 茴香炒 山茱萸 食茱萸

吳茱萸 青皮 陳皮 羌花醋煮比前方宜減半

馬蘭花各等分較之前方多長葉更青皮

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三十九丸空心溫酒下

○天台烏藥散治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥 木香 茴香炒 青皮

良姜炒各半兩 檳榔二枚 川練手十枚 巴豈七十枚

右先以巴豈微打破用川練手麩炒黑去麩及巴豈不用其餘藥同為細末每服一錢溫酒調下甚者姜酒調下

○濟生葵子湯治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥膀胱癰

赤茯苓 猪苓 冬葵子 枳實

瞿麥 木通 黃芩 車錢子

滑石銹半 甘草二分半

右細切作一服如生姜三片水煎空心服

鑑室

鑑室

○丁香練實丸治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經病也乃腎肝受邪故治同法

當歸

附子炮

茴香炒

川練子各一兩

右細切用好酒三升同煮酒盡為度焙乾為細末每末子一兩入

丁香

木香各半錢 玄胡索五錢

全蝎十三箇炒

右為末與前藥同拌勻酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸加至一百丸空心溫酒送下

○一捏金散治七疝及奔豚氣痛不可忍者神効方見氣門

○丹溪活套云凡治七疝多用熱藥而獲効者即內經從治之法耳須用寒涼藥監制之不可純用大熱之劑如烏頭附子之類令人久服多服必變劇不可治矣但宜以二陳湯

加枳實橘核梔子山查等藥煎入生薑汁熱辣飲之。恐有瘀血作痛者本方加玄胡索桃仁泥。○如有氣作痛者本方加木香茴香練實等藥。○如六脉沉細手足厥冷者本方加附子乾姜肉桂之類以佐之。○如畢九痛甚者加荔枝核乳香沒藥為細末調入本方煎藥內或另用順流水調服亦可。○如木腎腫大如升斗者本方去甘草加海藻昆布荔枝核茴香川練等藥為末順流水調服作煎。○祖傳經驗馬蘭花丸治七疝癰氣及婦人陰癰墜下小兒偏墜等証無有不効者。

馬蘭花

鹽炒

川練手

橘核

海藻

海帶

昆布

三味俱酒洗

桃仁

去皮尖各一兩

厚朴

姜制

木通

枳實

黃白炒

玄胡索

肉桂

木香

檳榔

各半兩

脉沉細手足逆冷者加川烏

頭一箇

炮五錢

右為細末酒糊丸如梧桐子大每服五七

十九或酒或姜鹽湯送下

脚氣三十六

論

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下先受之蓋脾主四肢足居於下而多受其濕濕鬱成熱濕熱相搏其病作矣是以先從氣衝穴隱核痛起及兩足脛紅腫或惡寒發熱狀若傷寒筋掣痛是其候也或一旬或半月後作如故漸而致於足筋腫大如瓜瓠者多有之矣東南卑濕之地比比皆是西北高燥之方鮮或有之古方名為緩風繇宋元以來呼為脚氣原其所由非止一端有從外感而得者有從內傷而致者所感雖有內外之殊其為濕熱之患則一也故異法方宜論云北方者其地高陵居風寒冰冽俗飲醴酪而肉食皆以飲多速飲為能經曰因而大飲則氣逆夫乳酪醇酒

者濕熱之物飲之屬也加以奉養太過又滋其濕水性順下
氣不能响故下注於足脛積久而為腫滿疼痛此飲食下流
之所致也東南地勢卑下濕氣迷滿山澤行履坐卧無處不
有若稟壯而氣實者不能侵賊其氣虛血少之人或遇房勞
及負重遠行衝冒雨雪寒濕乘虛而客襲於足而成此証是
外感寒濕之所致也大抵病因有內外之殊而治法無表裏
之異耳故為治者宜通用蒼朮白朮之類以治其濕知母黃
柏條芩之類以去其熱當歸芍藥生地黃之類以調其血朮
朮枳擲之類以行其氣羌活獨活以利關節而散風濕兼用
木通防己川牛膝之類引藥不行及消腫去濕以為此証大
法不過如此東垣曰濕淫所勝治以苦溫以苦辛發之透關
即勝濕為佐以苦寒泄之流濕清熱為臣故立當歸粘痛湯

以治之其効捷如影響針經曰有道以來必有道以去治宜多以熇灸為佳以導引其濕熱之氣外出也學者宜詳究焉

脉法

脉弦者風濡弱者濕洪數者熱遲澀者寒微滑者虛牢堅者實結則因氣散則因憂緊則因怒細則因悲

方法

丹溪曰脚氣從濕從下須提起其濕在下之藥隨氣血用入心則恍惚謬妄嘔吐食不入眠卧不安左寸脉乍大乍小或乍有乍無者死○入腎則腰脚腫小便不通呻吟目與額皆黑氣衝胃而喘左尺脉絕者死

○治濕熱脚氣方

紫蘇

黃柏鹽酒拌炒

芍藥

木瓜

澤瀉

木通

防已

檳榔

蒼朮

枳殼麩炒黃色

甘草炙

香附

羌活

痛加木香腫甚加大腹皮發熱加黃連大黃

右細切水煎服痛除腫退則住服

○防已飲

黃柏

酒炒

蒼朮

鹽水炒

白朮

防已各七分

生地黄

枳榔

川芎

各半錢

犀角屑

甘草節

木通

黃連

各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗食前溫服○有熱加黃芩○熱甚及天令暄熱加石膏○有痰加竹瀝姜汁或南星○便秘加桃仁○小便秘澀加牛膝○如常腫者專主乎濕熱肥人加痰藥

○健步丸

蒼朮

當歸尾

各一兩

生地黄

陳皮

芍藥

各一兩半

川牛膝

五錢

大腹子

三錢
茱萸

條芩

各五錢

桂心

一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服一百丸白木

木通送下食前服

○加味四物湯治脚氣衝心

本方加炒黃柏煎服更於湧泉穴用附子末津調捏作餅

子貼穴上以艾炷多灸以泄引其熱不行下

○一方治食積瀉注用

蒼朮

防己

黃柏

酒炒

南星

川芎

白芷

犀角

檳榔

已上

血虛加川牛膝龜板酒糊為丸服

○轉筋屬血熱四物湯加酒芩紅花煎服○有筋動於足大指

上至大腿近腰結了此奉養厚因風寒而作又當加蒼朮

南星

東垣

○羌活導滯湯治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻滯

先以此藥導之後用當歸粘痛湯以徹其邪

羌活

獨活

各一分錢

防已

當歸尾

各七分

大黃

二錢四分

枳實

五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗空心溫服

東垣

○當歸粘痛湯治濕熱脚氣為病肢節煩疼肩背沉重膏肓不

利兼遍身疼痛下注足脛腫痛脚膝生瘡赤腫及裏外生

蒼朮水不絕或痒或痛並宜服之

鬼活一錢

人參

苦參

升麻

葛根

蒼朮

各四分甘草炙

黃芩

酒炒

茵陳

酒炒各一錢

防風

當歸身

酒洗

知母

去毛酒制

澤瀉

猪苓

去皮

白朮

各半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服臨卧再

進一服

○開結導引丸治脚氣飲食不消心下痞悶

白朮

橘紅

澤瀉

茯苓

神麴

炒

麥芽麴

炒

半夏

炮七次各一兩

枳實

麴炒

巴豆霜

各二錢半

青皮

乾生姜

各五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九或七

八十九溫水下

○麻黃左經湯治風寒溫流注足太陽經腰脚牽痺閑節重痛

增寒壯熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛脚軟等証並皆之治

麻黃

乾葛

細辛

白朮

茯苓

防己

肉桂

羌活各半錢

甘草

防風去芦各二分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○半夏左經湯治足少陽經為風寒濕流注發熱腰脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心腿髀緩縱不能行步

半夏

乾葛

細辛

白朮

麥門冬

茯苓

肉桂

防風

乾姜

黃芩各半錢少草

甘草

柴胡各三分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一盞溫服如熱悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

三

○六物附子湯治四氣流注於足大陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子

炮

肉桂

防己

各一錢

甘草

炙五分

白朮

茯苓

各七卜

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○局方換腿丸治足三陰經為四氣所乘發為牽痺緩縱上攻

膏脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行步艱難

薏苡仁

炒

南星

炮

石南葉

石斛

檳榔

草薢

川牛膝

酒洗

羌活

防風

木瓜

各四兩

黃芪

當歸尾

天麻

續斷各一兩

右細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸鹽湯下

方局

○五積散治寒濕流注經絡脚膝腫滿疼痛等証方見腰痛門

○導水丸治脚氣跗腫疼痛或發熱惡寒濕熱大盛者

大黃 黃芩各二兩黑丑取頭末滑石各四兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服四五十丸溫水送

下以利為度

問河

○除濕丹治諸濕病腰膝腫痛足脛浮腫筋脉勁急津液凝滯

便溺不利等証

枳榔 甘遂 威靈仙 赤芍藥

澤瀉 葶藶子各二兩乳香 沒藥各一兩

黑丑 半兩 大戟 炒三兩 陳皮 四兩

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸溫水下以利為度

○三花神祐丸治濕熱流注足膝浮腫肢節煩疼行步重墜等方見麥欽門

○祖傳經驗杉木節飲治脚氣發作惡寒發熱兩足腫大心煩体痛垂死者

杉木節四兩 檳榔七枚 大腹皮酒洗 青橘葉四十片

右細切作一服用順流水三升煎至一升分作三服一日服盡如大便通利黃水其病除根未愈過數日再煎一劑服之病根去為度外以杉木橘葉不拘多少煎湯洗之神

○又經驗勝濕餅子治遠年脚氣足脛腫如瓜瓠者

黑丑一兩取頭末五錢 白丑一兩取頭末五錢 甘遂連珠者五錢

右三味再同研極細外用蕎麥麪一兩半連藥末和勻水調捏為餅子如折三錢大放飯上蒸熟每服一併空心嚼茶清送下以利為度末利又服一餅忌甘草菰菜生冷油膩魚腥等物

痛風 古名痛痺 三十七

論

內經曰諸風掉眩強直支痛痠戾裏急筋縮皆足厥陰風木之位肝膽之氣也又曰風寒濕三氣雜至合而為痺其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺以冬遇此為骨痺以春遇此為筋痺以夏遇此為脉痺以至陰六月也遇此為肌痺以秋遇此為皮痺夫古之所謂痛痺者即今之痛風也諸方書又謂之白虎歷節風以其走痛於四肢骨節如虎咬之狀而以其名名之耳丹溪曰大率因血虛受熱其血已自沸騰或加之以涉水受濕熱血得寒汚濁凝滯不得運行所以作痛夜則痛甚行於陰也治以辛溫監以辛涼流散寒濕開通鬱結使血行氣更能慎口節慾無有不安者也

脉法

脉經曰脉澁而緊者痺 少陰脉浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏則疼痛如掣

或人脉澁小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致也

寸口脉沉而弦沉則主骨弦則主筋沉則為腎弦則為肝汗出入水中因水傷心歷節痛而黃汗出故曰歷節風也

味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄味鹹則傷骨骨傷則矮名曰枯枯泄相搏名曰泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱變為歷節風疼痛不可屈伸

方云

冊溪方注
十一

丹溪曰因濕痰濁血流注為病以其在下焦道路遠非烏附
氣壯不能行故用為引經若以為主治之非惟無益而有
殺人之毒此病必行氣流濕舒風導滯血補新血降陽升
陰治有先後須明分腫與不腫可也不可食肉肉屬陽大
能助火素有火盛者小水不能制若食肉厚味下有遺溺
上有痞悶須將魚腥麪醬酒醋皆斷去之先以二陳湯加
酒浸白芍藥少佐以黃連降心火看作何應又為嘔噦也
○大法用蒼朮南星川芎白芷當歸酒芩在上者加羌活桂枝
桔梗威靈仙在下者加牛膝防己木通黃柏
○加味四物湯治白虎歷節風証本方加一

桃仁

牛膝

陳皮

茯苓

甘草

白芷

草龍胆

如痛在上者屬風加羌活桂枝威靈仙○在下者屬濕加牛膝防已木通黃柏○氣虛者加人參白朮龜板○有痰者加南星半夏生姜○血虛者倍川歸川芎佐以桃仁紅花水煎服之

○因痰者二陳湯加酒洗黃芩羌活蒼朮

○因濕者用蒼朮白朮佐以竹瀝姜汁及行氣之藥○或曰有

濕鬱而周身走痛或關節間痛遇陰寒即發當作濕鬱治

或用白朮一味酒煎服之其痛立愈

○肥人多是濕與痰飲流注經絡脉必滑瘦人多是血虛與執

並

○下部有濕腫痛用防已龍胆草黃柏知母固是捷藥若肥人病此宜蒼朮白朮南星滑石茯苓之類瘦人宜用當歸紅

花朮仁牛膝栴柳等藥

○薄桂味淡者能橫行手臂領南星蒼朮等藥至痛處

○威靈仙治上体痛風人虛弱勿用

○一方治上中下痛風

黃連

酒炒

蒼朮

米泔浸宿

南星

各二兩

神麴

炒

台芎

各一兩

防己

白芷

朮仁

各五錢

威靈仙

酒炒

桂枝

橫行手

羌活

各三錢

草龍膽

一錢五分

酒紅花

五分

右為細末神麴糊丸如梧桐子大每服一百丸空腹服

○大羌活湯治風濕相搏肢節疼痛

羌活

升麻

各一錢

獨活

七分

蒼朮

防己

威靈仙

白朮

川歸

茯苓

澤瀉各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗空腹溫服

○四妙散治走注疼痛

威靈仙

酒浸焙乾五錢

獨羊角灰

三錢

蒼耳子

半錢

白芥子

一錢

右為細末每服一錢匕姜湯調下

○一方治飲酒濕痰痛風

黃柏

酒炒

威靈仙

酒炒各五錢

蒼朮

米泔浸一宿

羌活

各三錢

甘草

炙三錢

陳皮

去白

芍藥

各一錢

右為細末每服一錢匕生姜湯調下

○凡因久痢後兩脚痠軟疼痛或膝腫如鼓槌者此亡陰也宜

以芎歸熟地黃等補血藥治之自愈挾氣虛者加參芪挾

風濕者加羌活防風白朮之類切不可絕作風治反燥其

血終不能愈

○氣血兩虛有痰濁陰火痛風

人參

山藥

海石

商星

各一兩

白朮

熟地黃

黃柏

酒炒

龜板

酥炙各

乾姜

燒存性

瑣陽各五錢

右為酒糊為丸服末

○肢節腫痛痛屬火腫屬濕其受風寒而發動於經絡之中濕

熱流注於肢節之間而無已也

麻黃

去根節

赤芍藥

絡一

防風

荆芥

羌活

獨活

白芷

蒼朮

威靈仙

片苓

酒浸

枳實

桔梗

葛根

川芎各半錢

甘草

當歸稍

升麻

各三

下焦加酒黃柏

○婦人加酒紅花○腫多加換

方局

榔大腹皮澤瀉更加沒藥一錢定痛尤妙○一云脉澁數者有瘀血宜用死仁紅花芍歸加大黃微利之

○二妙散治脚膝下焦濕熱成痛

黃栢

酒浸焙乾二兩

蒼朮

米泔浸春秋二宿冬三宿夏一宿四兩

右為細末沸湯入姜汁調服或用蒸餅為丸姜鹽湯送下

二味皆有雄壯之氣表實氣實者加酒少許佐之有氣加氣藥血藥加補血藥痛甚者加生姜汁熱服虛

冊

○潜行散用黃栢一味酒浸曝乾為細末每服方寸七煎四物

湯調下治血虛陰火痛風藥也多服貼數取効

冊

○手臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作痛也

半夏

酒岑

白朮

南星

香附各一錢陳皮

茯苓

各五分

蒼朮

一錢半

威靈仙三錢

甘草三分

右細切作一服加生姜五片水二盞煎至一盞食後服

○加味二陳湯治臂痛

本方加酒芩羌活威靈仙入姜水煎食後溫服

○一方治痛風神効

赤芍藥

青皮各一錢半

紫威

台芎各七分

威靈仙

木鱉子一錢半

防風七分

甘草五分

右細切作一服酒煎服之

○治婦人背脊脇走痛

赤芍藥

桂枝

蒼朮各半錢

香附

炒黃柏各一錢

威靈仙七錢半

甘草五分

右細切作一服水二盞煎至一盞服

餘冊

○治走注疼痛方

威靈仙

蒼朮

桂枝

川歸

薤仁

云皮尖炒各錢

生薤仁

七箇

甘草

二錢

川芎

一錢半

餘冊

○定痛丸治風濕一切痛

乳香

沒藥

金星草

地龍

去土炒

五靈脂

木鱉子

去壳

右各等分為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九溫酒磨化下或只作小丸溫酒送下亦可

餘冊

○世俗有用草藥而獲速効者如用石絲以為之君過山龍等以為之佐皆性熱而燥者不能養筋滋陰但能燥濕病之

方局

淺者濕痰得燥而開瘀血得熱而行故有速効若病之深而血少者愈却愈虛而病愈深矣戒之戒之

○黃芪酒治風寒濕痺身体頑麻皮膚燥痒筋脉寧急語言蹇澁手足不遂等証

黃芪

防風

桂枝

天麻

萆薢

石斛

虎脛骨酥炙

白芍藥

當歸

雲母粉

白朮

茵芋葉

木香

仙灵脾

甘草

川續斷各一兩

右細切以生絹袋盛用無灰好酒一斗以麴躍浸之包封罐口勿令泄氣春五夏三秋七冬十日每服一盞溫飲之不拘時候

方局

○獨活寄生湯治肝腎虛弱感冒風濕致痿痺兩足緩縱軟弱

不仁方見腰痛門

○防風天麻散治風濕麻痺肢節走注疼痛中風偏枯或暴暗不語內外風熱壅滯昏眩

防風

天麻

川芎

羌活

白芷

草烏頭

白附子

荊芥穗

當歸

甘草炙略

白滑石二兩

右為細末每服半錢加至一錢熱酒化蜜少許調下覺藥

力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大每服半丸至一

丸熱酒化下白湯亦可此藥散鬱用結宣風通氣之妙也

○舒筋湯治臂痛不能舉蓋是氣血凝滯經絡不行所致一名

通氣飲子一名五痺湯其効如神

片子姜黃錢甘草炙

羌活錢半

海桐皮去外皮

當歸

赤芍藥

白朮各一錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞去粗磨
沉香少許入內溫服凡腰已上痛食後腰以下痛食前
○祖傳經驗九藤酒治遠年痛風及中風左癱右瘓筋脉拘急
日夜作痛叫呼不已等証其功甚速

青藤

釣鈎藤

紅藤

即埋省

丁公藤又名風藤

桑絡藤

兔絲藤

即無根

天仙藤

即青木香也

陰地蕨

名地蕨

取

五味子藤

俗名紅

忍冬藤

各二兩

右細切以無灰老酒一大斗用磁罐一箇盛酒其藥用真
綿包裹放酒中浸之密封罐口不可泄氣春秋七日冬十
日夏五日每服一盞日三服病在上食後及卧後服病在
下空心食前服

○經驗加味二妙丸治兩足濕痺疼痛或如火燎從足跗熱起

漸至腰膝或麻痺痿軟皆是濕為病此藥主之

蒼朮

四兩

米

黃柏

二兩

酒

乾

川牛膝

去兩

當歸尾

酒洗

一兩

當歸尾

酒洗

一兩

當歸尾

酒洗

一兩

當歸尾

酒洗

川草薢

一兩

防己

一兩

龜板

酥炙

一兩

龜板

酥炙

一兩

龜板

酥炙

一兩

龜板

酥炙

一兩

龜板

酥炙

一兩

龜板

酥炙

一兩

右為細末酒煮麴糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心

姜鹽湯下

○經驗川木通湯一男子年四十歲因感風濕得白虎瀝節風

証變身抽掣疼痛足不能履地者三年百方不効身體羸

瘦骨立自分於死一日夢與木通湯服愈遂以四物湯加

木通服不効後以木通二兩剉細長流水煎汁頓服服後

一時許變身痒甚上體發紅丹如小豈大粒舉家驚惶隨

手沒共出汗至腰而止上體不痛矣次日又於前煎服下

一 体又發紅丹方出汗至足底汗乾後通身舒暢而無痛矣
一月後人壯氣復步履如初後以此法治數人皆驗故錄
於此以示後學

○經驗薰洗痛風法治手足冷痛如虎咬者

用樟木屑一斗以急流水一担熬沸以樟木屑置於大桶
內桶邊放一兀筵用前沸湯泡之桶內安一矮筵予令人
坐桶邊放脚在內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐
壞眼其功甚捷

痿証三十八

論

內經曰肺熱葉焦五歲因而受之發為痿躄心氣熱為脉痿
則經縱而不任地肝氣熱為筋痿故筋急而掌脾氣熱為肉

痿則胃乾而渴肌肉不仁腎氣熱為骨痿則腰膝不舉骨枯
而髓減又曰治痿者獨取陽明一經陽明者五歲六府之海
主潤宗筋能束骨而利機關也衝脉者經脉之海也主滲灌
谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣衝而陽明
為之長皆屬於帶脉而絡於督脉故陽明虛則宗筋弛縱帶
脉下引故足痿不用也治法各補其榮而通其腧調其虛實
和其逆順筋脉骨肉各以其時受月言治諸痿宜調補各藏
以待其旺月而病安也
丹溪曰內經謂諸痿起於肺熱又謂治痿獨取陽明一經蓋
肺金體燥居上而主氣畏火者也脾土性濕居中而主四肢
畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡于畏而
侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木
寡于思而侮所勝脾得水邪而傷矣肺熱則不能管攝一身

脾傷則四肢不能為用而諸痿作矣。瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有。補北方則必火降而西方不虛何肺熱之有。故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣。治痿之法無出於此。雖然天產作陽厚味發熱凡病痿者若不淡薄食味知吾必不能保其安全也。又曰內經論風論痿各有篇目源流不同治法迥異。苟方以治風之藥通治諸痿何其謬哉。按丹溪此論一出掃盡千古之弊。學者睨而不視則為瞶者之雷。霆瞽者之日月耳。夫醫為人之司命其可不盡心於此乎。

脉法

脉經曰肺痿脉必浮而弱。其人欲欬不得欬。欬則出乾沫。久又則小便不利。久

寸口脉不出。反為發汗。陽脉早索。陰脉不澁。三焦踰躅入而

不出陰脉不澁身体反冷其内反煩多唾唇燥小便反難

此為肺痿傷于津液便如爛瓜亦如豚膏但因誤發汗也

方法冊溪方九條

冊溪曰有濕熱有痰有血虛有氣虛亦有死血者有食積妨

碍升降者

盧氏曰上文論痰起於肺熱實痰之本論治法之大要也而此云然者蓋以其發而為病所因

所挾或有不同而主治亦當各著其重也

○東垣取黃栢為君黃芪等補藥為輔佐以治諸痿無一定之

方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾

氣者臨病制方其善於治痿者乎

○濕熱用東垣健步丸加燥濕降火之劑黃栢黃芩蒼朮之類

○濕熱用二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃栢之類入竹瀝姜汁

○血虛用四物湯加蒼朮黃栢下補陰丸

○氣虛用四君子湯加蒼朮黃芩黃柏

○黃柏蒼朮治痿之要藥也

○虎潛丸補腎丸皆可治痿

○加四物湯治諸痿四肢軟弱不能舉動味

當歸身錢一 熟地黃錢三 白芍藥 川芎各七分

五味子九枚 麥門冬錢一 人參半錢 黃柏一錢

黃連半錢 知母三分 杜仲七分 牛膝三分足不軟者不用

蒼朮一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服酒糊為丸服亦可一云血虛者以四物湯加黃柏蒼朮下補陰丸

○健步丸治膝中無力屈伸不便脚背腿脚沉重行步艱難

羌活 柴胡 滑石炒 甘草炙

腰

瓜蒌根

酒洗

肉桂

各五分

防風

澤瀉 各三錢

防已

酒洗 一兩

川烏

炮

苦參

酒浸 各三錢

右為細末湯煮麪糊為丸如梧桐子大每服七十丸煎愈

風湯下

一云荆芥湯下按荆芥湯又為愈風湯也

○大防風治兩足痿弱或沉重麻痺不能行動兩膝虛腫名曰

鶴膝風等証

方見中風門

○祖傳經驗治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下上衝腿膝

等証因濕熱所成者

蒼朮

米泔浸 一兩 黃柏 酒浸 各四兩

牛膝

去芦 二兩

龜板

酥炙

虎脰骨

酥炙 防已 各一兩

當歸尾

二兩

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服七十丸或一百丸

空心姜盞湯下一方加炮附子五錢

○又經驗鹿角膠丸治血氣虛弱兩足痿軟不能行動久卧床褥之証神効

鹿角膠一斤 鹿角霜

熟地黄各半斤 川牛膝

白茯苓

兔絲子

人參各二兩

當歸身四兩

白朮

杜仲各二兩 虎脰骨酥炙 龜板酥炙各二兩

右為細末另將鹿角膠用無灰酒二盞烱化為丸如梧桐子大每服一百丸空心姜鹽湯下

論

諸虫附發砂三十九

內經曰腸胃為市無物不受無物不包又曰飲食自倍腸胃
乃傷若夫飲食不能運節則朝損暮傷自傷成積積久成熟
濕熱相生而諸般奇形之虫各從五行之氣而化生矣若腐
草為螢之類是也外臺秘要所謂九虫者皆能食人府藏一
曰伏虫長四寸許二曰蛔虫長尺許三曰白虫長四五尺餘
四曰肉虫狀若爛杏五曰肺虫其狀如蚕六曰蠅虫狀如蝦
蟇七曰弱虫又名瞓虫狀如瓜瓣八曰赤虫狀如生肉九曰
蟯虫狀如茱虫形至細微其伏虫又為諸虫之主也蛔虫生
虫生發多則貫心即殺人白虫母子相生其形轉大而長亦
能殺人肉虫食人令人煩滿肺虫令人咳嗽蠅虫令人嘔吐

欬逆喜噦弱虫令人多唾亦虫令人腸鳴繞虫居廣腸多則
為痔劇則為癰因人瘡處以生諸癰疽癰痂疥齕蝨若虫
之類無所不為人亦不必盡有亦不必甚多或偏有或偏無
皆能為害者也凡此諸虫依附腸胃之間若元氣尚實未為
大害稍有虛損遂能侵蝕隨其虫動而變生諸病也若夫膈
噎勞瘵癰風蠱脹狐惑傷寒等証無不生虫又如蟻鼠應聲
虫之類未易悉舉醫者宜於各類推而治之可也

脉法

脉沉實者生虛大者死 尺脉沉而滑者為寸白虫
屢蝕陰疔脉虛小者生勁急者死

外臺云虫脉當沉弱而弦今反洪大即知蛔虫甚也

方法

用漢方法
凡二條

丹溪曰濕熱之生虫藏府虛則侵蝕上半月虫頭向上易治

下半月虫頭向下難治已上二月字忘是當作三月字先以

蜜或砂糖或炒吃引虫頭向上然後用殺虫藥

○腹內熱腸胃虛虫行求食上唇有瘡曰惑虫食其藏下唇有

瘡曰狐虫食其肛

○治愚桃仁湯治狐惑唇口生瘡上唇虫食其藏下唇虫食其

桃仁 槐子 艾各五錢大棗十五

用水二盞半煎至一盞半分二服

○雄黃銳散治前証

雄黃 青箱子 苦參 黃連各二錢

桃仁一錢

右為末搗新艾汁和棗如小指頭大納穀道中消虫食其

肝也

○寶鑑化虫丸治諸虫

鶴虱去七

枳柳

苦練根東引不出土者

胡粉炒各一兩

明白礬焙二錢半

右為細末米糊為丸如梧桐子大一歲兒服五丸量人大小加減丸數溫漿水入生麻油三四點打勻送下清米飲亦可不拘時候其虫細小者皆化為水大者自下

○集効丸

木香

鶴虱炒

枳柳

訶子麩裏煨去核

蕪荑炒

附子炮去皮

乾姜各七錢半

大黃一兩半

烏梅十四箇去核

右為末煉蜜丸如麻子大陳皮湯或醋湯下一方加黃連

黃栢各七錢半

○萬應丸

袂榔

兩五

大黃

兩八

黑丑

四兩

已上

味為末

皂莢

十錢

不

者

者

者

苦練根皮一斤

右先以皂莢苦練用水二大碗熬成膏一處搜和藥末為丸如梧桐子大又以沉香木香雷丸各一兩為末為衣先以沉香衣次用雷丸衣又次用木香衣每服三九四更時用砂糖水送下

○一方用鷄子炒白臘壺酒糊丸服治寸白虫

○一方黑鉛炒成灰袂榔末等分和勻末飲調下

○化虫丸能化虫為水

硫黃

兩一

木香

兩五

蜜陀僧

兩一

已上

味為末

附子

一兩

已上

味為末

者

者

外臺

右先以附子末醋一盞熬膏餘藥研為細末以附子膏和
勻丸如棗豆大每服二十九荆芥茶清下

○一方用苦樹根枳榔鶴虱三味濃煎湯飲之

○前胡湯治痺勞身熱內有白虫在痺為病令人好嘔而胃中
咳嘔而不出

前胡

白木

赤茯苓

細辛

杏仁

去皮尖
另研

草龍胆

常山

各一錢

枳實

松蘿

各七分旋覆花

五分

竹葉

七斤

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服○若腹中

熱滿悶加芒硝半錢梔子黃芩苦參各半錢加水煎忌桃

李雀肉醋生葱菜等物

○桑螵蛸湯治痺勞熱內有白虫食脾為病與前証同

茱萸

東引者

大麻子

八錢

陳皮

一兩半

右三味細切水煎服或下虫或下黃汁凡合此藥禁聲勿語虫覺便無効此方治虫甚驗

○五臍下氣元治肺勞熱瘦損內有肺虫在肺為病令人咳嗽氣喘或謂憂忿氣膈寒熱皆從勞之所生名曰膏肓疾針灸不著

麥門冬

五兩

蜀椒

炒出汗

遠志肉

附子

各半兩

乾生薑

半兩

甘草

炙半兩

人參

七錢半

桂心

二錢半

百部

白朮

黃芪

各七錢半

杏仁

去皮尖及仁者二十四粒

細辛

半兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸徐徐嚥化熱汁忌猪肉冷水海藻菰菜生葱桃李雀肉等物

外臺

○千金散療腎勞熱四肢腫急蟻虫生於腎中為病

貫衆 三兩炒 乾漆 二兩炒 蕪荑 胡粉

槐白皮 各一兩 吳茱萸 十粒 杏仁 四粒 炒 去

右為細末平旦以井花調服方寸匕增之以病瘥止水

外臺

○三聖飲子治勞熱生虫在肺為病

茱萸根 五兩 桑白皮 一升 狼牙子 三兩

右三味細切以酒七升煮取一升半平旦服盡

外臺

○五鳳丸治肝勞熱生長虫在肝為病令人恐懼不安眼中生

烏鷄卵 五枚 東引吳茱萸根 切三升 黃臘 三兩

乾漆 四兩炒 粳米粉 半升

右五味以茱萸根乾漆杵為細末和入銅鉚中火煉可丸

如小豈大隔宿勿食後飯清晨以米飲下一百二十丸小

兒五十九虫即爛盡

○雷公九治心勞發熱心長有長虫名曰蠱虫長一尺許真心裏

即死

雷九

妙五枚陳皮

桃仁

各一兩二錢半去皮尖另研

貫衆

蕪荑

青箱子

乾漆

炒鹽不冬一兩

亂髮

如鷄子大塊旋內燒存性

殭蚕

十枚炒

右為細末煉蜜九如小豈之空心溫酒送下二十九日三

服

付前用湯以不七方治五蟲服勞虫方也當與前勞極方互用

外臺

○廣濟藥和虫方

酸石榴根

陳引者切二升

桮榔

十枚切

右二味以水七升煮取二升半去粗以粳米煮稀粥平日

空腹食之小間虫並死快利神効

外臺

○又治蛔虫方

用苦練根生子者東引刮去外麁皮取肉 白皮二兩以水三碗煮取一碗半去粗用晚粳米三合煮藥粥空心先以炒肉一二片吃引虫向上然後進藥粥一二口少頃吃一二口漸漸加至一碗或二碗其虫盡下而愈

○祖傳經驗枳榔丸治小兒疳積氣塊痛腹大有虫等証

三稜

細切醋炒五錢

義木

細切醋炒五錢

枳榔

一兩 青陳皮

去穢焚灰

陳皮

去白各半兩

蕪荑

二錢半

雷丸

五錢 鶴虱

三錢

乾漆

五錢炒

木香

三錢

良姜

二錢 砂仁

一錢

麥蘖

半兩

胡黃連

三錢

甘草

三錢 神曲

五錢

右為細末醋米糊為丸如菴豈大每服三五十九空心淡姜湯下今加史均子肉五錢尤妙

○又經驗治婦人陰蝕瘡陰戶中有細虫其痒不可飲食入藏腑即死令人發寒熱與勞証相似

先用蛇麻子煎湯洗淨搥乾付後藥 梓樹皮不炮右焙乾為末入枯礬四分之一射香少許付之立効

○予曾治一婦人因採桑見桑有金虫如蚤者被其毒謂之金母蚤毒腹中疔痛欲死召予治予以樟木屑濃煎湯與之大吐吐出有金絲如亂髮者一塊腹痛減十分之七八又與甘草湯連進二三盞而安